

2010年执业西药师药物分析：普萘洛尔给药说明执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E6\\_89\\_A7\\_c23\\_645924.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E6_89_A7_c23_645924.htm) 用量必须强调个体化，不同

个体、不同疾病用量不尽相同，肝、肾功能不全者用小量；

糖尿病患者虽可引起血糖过低，但在非糖尿病人中则无降血糖作用；百考试题论坛 注意血药浓度不能完全预示药理效应，故还应根据心率及血压等临床征象指导临床用药；

口服可以在空腹时，也可与食物共进，后者可使本品在肝内代谢减慢，生物利用度增值；冠心病患者使用本品不宜骤

停，否则可出现心绞痛、心肌梗塞或室性心动过速；甲亢病人用本品也不可骤停，否则使甲亢症状加重；来源：考试

大的美女编辑们 长期用本品者撤药须逐渐递减剂量，至少经过3天，一般为2周；长期应用可在少数病人出现心力衰

竭，倘若出现，可用洋地黄苷类和（或）利尿药纠正，并渐递减达停用。应用本品过程中应定期检查血常规、血压、心

功能、肝功能、肾功能，糖尿病病人应定期查血糖。百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com) (1) 甲亢合并心功能

不全者慎用，因本品可使心脏收缩功能减弱，必须采用时，应合用强心药。(2) 作为手术前准备，其优点为奏效快，

疗程短，往往数天至一周左右即可控制症状，使心率降至正常范围。由于本品作用往往短暂，故必须一直用药到手术日

晨，在手术中必要时需静脉注射，手术后也需继续应用，一直到血T<sub>4</sub>、T<sub>3</sub>降至正常。单用本品作手术前准备不如抗甲状腺

药物加碘剂可靠，故主要用于不能耐受抗甲状腺药物者及急需紧急手术者。更多信息请访问：执业药师网校 百考试题

论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏相关  
推荐：2010年执业西药师药物分析：普萘洛尔的不良反  
2010年执业西药师药物分析：普萘洛尔的药物相互作用  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)