

2010年执业西药师药物分析：普萘洛尔的用法用量执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E6_89_A7_c23_645927.htm

1.抗心律失常口服，一次1030mg，一日34次，应根据需要及耐受程度调整用量。严重心律失常应急时可静脉注射13mg，以每分钟不超过1mg的速度静注，必要时2分钟后可重复一次，以后隔4小时一次。小儿用量尚未确定，一般口服按体重每日0.51.0mg/kg，分次服；静脉注射按体重0.010.1mg/kg，缓慢注入，一次量不宜超过1mg. 2.心绞痛口服，开始510mg，每日34次，每3日可增加1020mg，可渐增至每日200mg，分次服。 3.高血压口服，一次510mg，每日34次，按需要及耐受程度逐渐调整，至症状被控制。 本文来源:百考试题网 4.肥厚性心肌病口服，一次1020mg，每日24次，按需要及耐受程度逐渐调整。 5.嗜铬细胞瘤口服，一次1050mg，一日34次，术前用3天，常与受体阻滞药同用，一般应先用受体阻滞药，待药效出现并稳定后再加用本品。 【制剂与规格】盐酸普萘洛尔片10mg. 更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏相关推荐：2010年执业西药师药物分析：普萘洛尔禁用慎用 2010年执业西药师药物分析：普萘洛尔给药说明 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com