

2010年中药鉴定中药材：臭李皮执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_645946.htm 【拼音名】Chòu Lǐ Pí 【别名】鼠李皮。来源：www.100test.com 【来源】药材基源：为鼠李科植物达乌里鼠李 *Rhamnus davurica* pall. 的树皮。拉丁植物动物矿物名：Rhamnus davurica Pall. 采收和储藏：夏末采收，晒干。 【原形态】达乌里鼠李 灌木或小乔木，高可达10m. 小枝粗壮，近对生，褐色或红褐色，顶端常有大的芽，而不形成刺，或于分叉处具短针刺。叶对生于长枝上，或丛生于短枝上；叶柄长1.5-4cm；叶片纸质，卵圆形或椭圆形，长4-13cm，宽2-6cm，先端突尖或渐尖，基部楔形或近圆形，边缘具细锯齿，齿端常有红色腺体，上面无毛，亮绿色，下面沿脉被白色疏柔毛，淡绿色，侧脉4-6对，网脉明显。花单性，雌雄异株，黄绿色；雌花1-3个生于叶腋或数个至20个簇生于短枝端，有退化雄蕊；花萼4裂，裂片狭卵形，锐尖；子房球形，2-3室；花柱2-3浅裂或半裂；雄花的雄蕊4，并有不育的雌蕊。核果球形，熟时黑色，直径5-7mm，基部有宿存萼筒。果梗长1-1.2cm. 种子卵圆形，黄褐色，背侧有狭纵沟。花期5-6月，果期7-10月。 本文来源:百考试题网 【生境分布】生态环境：生于海拔1800m以下的山坡林下，灌丛或林缘和沟边阴湿处。资源分布：分布于东北及河北、山西。 【性状】性状鉴别 本品为扁平或卷成槽状的干燥树皮，厚2-3mm. 表面粗糙，呈灰黑色，有纵横裂纹及小形横向延长的皮孔。枝皮较光滑。除去栓皮者，表面呈红棕色。内表面色较暗，有类白色纵纹理（纤维束）。质脆，易折断，断面纤维性。

气微，味苦。【化学成份】树皮含大黄素（emodin），大黄酚（chryso-phanol），芦荟大黄素（aloe-emodin），去氧鼠李素（deoxyrhamnetin），鼠李素（rhamnetin），异鼠李素（isorhamnetin），甲基异鼠李素（methyl isorhamnetin）等。

【药理作用】鼠李树皮水浸膏对小鼠有泻下作用。www.Examda.CoM考试就到百考试题【性味】苦；微寒；小毒【功能主治】清热解毒；泻下通便。主风湿热痹；热毒疮痍；大便秘结【用法用量】内服：煎汤，3-9g.外用：适量，煎水洗；或熬膏涂。【摘录】《中华本草》更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 相关推荐：2010年中药鉴定中药材：臭灵丹 2010年中药鉴定中药材：臭李子 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com