

萘啶酸片的药物相互作用临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E8_90_98_E5_95_B6_E9_85_B8_E7_c22_646009.htm

1.萘啶酸片与茶碱类合用时可导致后者血药浓度升高，出现茶碱的不良反应。故合用时应监测茶碱类血药浓度并调整给药剂量。 2.萘啶酸片干扰咖啡因的代谢，可导致咖啡因清除减少，血浆 $t_{1/2}$ 延长。 3.萘啶酸片与抗凝药华法林合用时可增强后者的抗凝作用，合用时应严考，试大收集整理密监测患者的凝血酶原时间。 4.萘啶酸片不宜与呋喃妥因合用，两者相互拮抗。 5.多种维生素，或其他含铁、锌离子制剂及含铝或镁的制酸药可减少萘啶酸片的口服吸收，导致尿液浓度减低，不得同时服用，不能避免时与服萘啶酸片间隔至少2小时。 6.与环孢素合用，可使其血药浓度升高，必须监测环孢素血浓度，并调整剂量。 7.与美法仑合用时会增加胃肠道毒性。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com