

药物性口炎的治疗措施口腔执业医师考试 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E8_8D_AF_E7_89_A9_E6_80_A7_E5_c22_646078.htm

一、全身治疗

- 1.寻找可疑的致敏药物，并立即停止使用；追溯近几天的食谱，有无进食含有药物进补的药膳饮食。
- 2.全身支持疗法 补充液体、维生素，以加速致敏原的排出，并维持水和电解质平衡。
- 3.抗组织胺药物 可选用苯海拉明25mg，每日3次，口服；扑尔敏4mg，每日3次，口服；或给息斯敏（正名：阿司咪唑，Astemizole）10mg，每日1次，口服。
- 4.肾上腺皮质激素 具有抗炎、抑制免疫反应作用，重症可用氢化可的松200~400mg静脉滴注；泼尼松每日30~60mg，或用地塞米松每日4.5~9mg，口服。
- 5.葡萄糖酸钙加维生素C0.5~1.0g，每日1次，缓慢静脉注射，以减少渗出。

二、局部治疗 应用消炎、止痛、抗感染的药物，如局部可贴敷各种抗生素药膜，或涂布2.5%金霉素甘油，敷中药散考试，大收集整理剂如溃疡散等，疼痛严重者可用1%普鲁卡因溶液含漱或涂布0.5%达克罗宁溶液以止痛。

注意事项：治疗前应询问患者有无药物或药膳过敏史；严格掌握用药适应证，以防滥用药物；用药宜简单，以减少变态反应性疾病的发生；并注意药物交叉过敏反应；慎用或禁用与原致敏药物化学结构式近似的药物；注意做药物过敏试验，如青霉素皮试，应同时准备好急救药品，以防万一。对确诊者，应向患者交代清楚，避免今后再用此药。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com