

药物性口炎的临床表现口腔执业医师考试 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E8_8D_AF_E7_89_A9_E6_80_A7_E5_c22_646082.htm 药物性口炎 口腔粘膜
损害常先于皮肤发生，有时亦可同时发生。患者应用某种药
物后可有一定的潜伏期，初次发作的潜伏期稍长，复发者则
缩短，有时可在24h内发病。 1、口腔粘膜 发病于口腔粘膜时
，患者首先感觉局部灼热不适。口腔任何部位均可发生损害
，如常见在唇、颊、舌、腭等处的粘膜上出现充血、水肿，
若有水疱发生，由于言、食时的摩擦运动而迅速破溃成大小
不等的糜烂面，并有渗出。此时，患者即感疼痛。 2、皮肤
发病于皮肤时，则好发于手足、颜面，出现红斑、丘疹等；
如重复使用致敏药物，即在原部位考试，大收集整理出现圆
或椭圆形红斑，边界清楚，数目多少不一，还可能合并水疱
，对此称之为固定药疹（fixeddrugeruption）；有时，除固定
部位外，亦可在新部位发疹。局部灼热、胀痒。一般持续1周
左右，而后消退。 3、眼部 发病于眼部时，常见为结合膜炎
，表现为球结膜充血、胀痛不适，分泌物增多等。 4、阴部
发病于阴部时，在生殖器、肛门等处也可出现红斑、糜烂等
现象。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细
请访问 www.100test.com