

慢性淋巴结炎应该做哪些检查临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E6_85_A2_E6_80_A7_E6_B7_8B_E5_c22_646237.htm 「检查」

1.应用淋巴系统造影X线检查或同位素检查可助于淋巴结肿大的鉴别诊断。 2.实验室，血常规见白细胞增多。 3.将脓痂或窦道内分泌物作涂片或浓缩法检查，可查出结核杆菌。「治疗」

一、全身治疗。 1.急性淋巴结炎应首先控制炎症，避免扩散，选用有效足量的抗生素如青、链霉素或其他广谱抗生素，亦可根据标本的药敏试验选择用药。 2.结核性淋巴结炎，可选用异烟肼100mg，每日3次，长期使用1824个月，链霉素0.5g，每日2次肌注。 3.支持疗法：补充必要的维生素及液体，调节电解质平衡。

二、局部治疗。 1.外敷消炎散以消炎止痛。 2.敷贴，结核性淋巴结炎如有穿破成痂，可在切除窦道刮除病变组织的基础上，用链霉素敷贴。 3.封闭疗法：脓肿尚未形成时可用青霉素、普鲁卡因溶液做淋巴结周围封闭（需先做皮试）。

三、手术治疗。 1.化脓性淋巴结已伴有口底间隙脓肿或蜂窝织炎时，应作切开引流术，以排除脓液及坏死组织。 2.对抗结核药物治疗效果不佳的单个或活动增殖性淋巴结结核，可采用手术切除并作病理检查。

更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com