

诺沃克类病毒胃肠炎的病因和症状临床执业医师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E8_AF_BA_E6_B2_83_E5_85_8B_E7_c22_646310.htm 诺沃克类病毒感染后出现以呕吐、腹泻为主要症状的疾病。诺沃克类病毒为一组属于微小病毒的病原体，诺沃克病毒为本组病毒的原型，系直径25~32nm，圆形，无包膜，似属于DNA病毒。仅人和猩猩易感。本组病毒抵抗力较强，耐乙醚、酸及热，60~30分钟不能完全灭活。「病因」(一)传染源 主要是急性期病人，感染后粪便排毒时间短暂，一般不超过72小时。(二)传播途径 以粪口途径为主，如水源、食物被污染，可造成暴发流行。(三)易感人群 人群普遍易感，但以大龄儿童及成人发病率最高。感染后免疫力短暂。(四)流行特征 本病广泛分布于世界各地。我国亦有流行的报道。全年均可发病，但以秋冬季春季多见。「症状」潜伏期一般24~48小时。起病突然，以轻重不等的呕吐或腹泻为主要表现。可单有呕吐或腹泻，亦可先吐后泻。腹泻为黄色稀水便，日数次至十数次不等，无脓血与粘液。可伴有低热、头痛、肌痛、乏力及食欲减退。病程自限，一般为2~3天，恢复后无后遗症。更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com