

化疗时怎样减少脱发的发生公卫执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_\\_E5\\_8C\\_96\\_E7\\_96\\_97\\_E6\\_97\\_B6\\_E6\\_c22\\_646322.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E5_8C_96_E7_96_97_E6_97_B6_E6_c22_646322.htm) 头发在化疗开始后的一段时间内就会发生脱落。但这是暂时的，化疗结束后会再长出来，且发质较前细软，颜色更有光泽，故不必烦恼。对如何减少脱发的发生，可注意以下几个方面：治疗前可考虑将头发剪短，因短发易于梳理，而且长发对头皮也会造成一定压力。宜用宽隙梳子梳理头发，每次梳理头发时动作要轻柔。选用温和的洗发、护发用品，定期清洗头发。洗发时动作轻，以免头皮和头发受损害。洗发后禁用吹风机和卷发筒。禁用橡皮筋编扎头发，禁编辫子。更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)