

联合瓣膜病变应该做哪些检查临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_\\_E8\\_81\\_94\\_E5\\_90\\_88\\_E7\\_93\\_A3\\_E8\\_c22\\_646483.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E8_81_94_E5_90_88_E7_93_A3_E8_c22_646483.htm)

(1) 体检 对患者进行详细的体格检查，可发现病人有劳力性心悸，气促。听诊可在二尖瓣膜听诊区闻及舒张期隆隆样杂音或收缩期吹风样杂音，主动脉瓣膜听诊闻及收缩期或舒张期杂音。(2) X线检查表现为肺血多，左、右心室均可增大。肺动脉段凸出。

(3) 心电图检查左、右心室肥厚，ST段及T波异常。(4) 彩色多普勒超声心动图检查(UCG)显示病变瓣膜的异常变化，呈狭窄关闭不全，血流状态异常。两个瓣哪一个病损重则该瓣病损引起的病理改变起主导地位，故最适宜检查为UCG，可明确看出各瓣膜的病损程度。更多信息请访问：[百考试题医师网校](#) [医师论坛](#) [医师在线题库](#) [百考试题执业医师](#) [加入收藏](#) [100Test](#) [下载频道](#) [开通](#)，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)