

2010年中药鉴定中药材：斑鸠占叶执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_646025.htm

【拼音名】Bān Jiū Zhàn Yè
【别名】战骨
【来源】来源：考试大 药材基源：为马鞭草科植物狐臭柴和黄毛豆腐柴的叶。百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com) 拉丁植物动物矿物名：Premna puberula Pamp. Premna fulva Craib. 采收和储藏：春、夏季采收，鲜用或晒干、
【原形态】1.狐臭柴，直立或攀援状灌木至小乔木，真株高1-3.5m。幼枝被柔毛，老枝无毛，黄褐色至紫褐色。单叶对生；叶柄长1-4cm，叶片纸质或坚纸质，长圆形、卵状椭圆形或卵形，基部楔形、宽楔形至近圆形，全缘或上部有波状深齿、锯齿或深裂，先端急尖至尾状尖，两面近无毛或疏生短柔毛。聚伞花序组成塔形圆锥花序长4-14cm，宽2-9cm，无毛至疏被柔毛，具披针形或线形苞片；花萼杯状，长1.5-2.5mm，外面被短毛和黄色腺点，先端5裂，裂齿三角形，齿缘有纤毛；花冠淡黄色，有紫色或褐色条纹，4裂，二唇形，上唇1裂片，圆形，下唇3裂，外面密被腺点，喉部有数行较长的毛，花冠管长约4mm；雄蕊4，二强，伸出花冠外；子房圆形，先端有腺点。核果倒卵形，紫色至黑色，有瘤突萼宿存。花、果期5-8月。生于海拔700-1800m的山坡路边丛林中。分布于陕西、甘肃、福建、湖北、湖南、广东、广西四川、贵州、云南。2.黄毛豆腐柴，本种与狐臭柴的主要区别是：幼枝、叶柄、叶背密被黄色平展长柔毛。聚伞花序排成伞房状；花冠绿白色。生于海拔500-1200m的常绿阔叶林阴处或路边灌木林中。分布于广西、贵州、云南。【生境分

布】生态环境：1.生于海拔700-1800m的山坡路边丛林中。2.分布于广西、贵州、云南。 本文来源:百考试题网 资源分布：1.分布于陕西、甘肃、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。2.分布于广西、贵州、云南。【性味】味辛；微甘；性平【功能主治】清湿热，解毒，续筋接骨。主水肿；毒疮；水火烫伤；筋伤骨折【用法用量】内服：煎汤，30-60g.外用：适量；捣敷；或研末调敷。【摘录】《中华本草》 更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 相关推荐：2010年中药鉴定中药材：斑茅 2010年中药鉴定中药材：斑蝥 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com