

2010年执业西药师药物分析：枸橼酸乙胺嗪执业药师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E6_89_A7_c23_646045.htm 名称：枸橼酸乙胺嗪药物别名

：海群生，益群生、枸橼酸、乙胺嗪、克虫神 Hetrazan
， Filazine 英文名称：Diethylcarbamazine Citrate说明：片剂
：0.05g、0.1g. 来源：考试大的美女编辑们 功用作用：本品对
丝虫成虫（除盘尾丝虫外）及微丝蚴均有杀灭作用，对易感
微丝蚴有两种作用：一为抑制肌肉活动，使虫体固定不动，
此可能为本药哌嗪部分的过度极化作用，促进虫体由其寄居
处脱开所致；二为改变微丝蚴体表膜，使之更易遭受宿主防
御功能的攻击和破坏。对成虫杀灭作用的机制不详。来源
：www.examda.com 班氏丝虫、马来丝虫和罗阿丝虫感染，也
用于盘尾丝虫病。对前三者一次或多次治疗后可根治，但对
盘尾丝虫病，因本品不能杀死成虫，故不能根治，亦可用于
热带嗜酸红细胞增多症患者。对蛔虫感染也有效，但已为其他
更安全、有效、新的抗蠕虫药所取代。用法用量：口服
，0.1g~0.2g/次，3次/日，7~14日为1疗程。一般两个疗程，
疗程间隔01~2个月。短程疗法：治疗马来丝虫，1.5g顿服或
分两次服为1日疗程。班氏丝虫，1g/日，1~2次/日，连服3日
为1疗程。以上治疗可服2~3疗程，每个疗程间隔1个月以上
。治疗罗阿丝虫病：宜用小剂量，每次按体重2mg/kg，每日3
次，连服2-3周，必要时间隔3-4周可复治。治疗盘尾丝虫病
：初期药物剂量宜小，按体重不超过0.5mg/kg，第1日1次，
第2日2次，第3日增至1mg/kg，口服3次，如无严重反应，增
至2mg/kg，日服3次，总疗程14日。如初治全身反应严重，可

暂停用或减少剂量。必要时可给以肾上腺皮质激素。预防：在丝虫病流行区，有将乙胺嗪掺拌入食盐中，制成药盐全民食用以杀死血液中微丝蚴，防治效果迅速可靠，为消灭丝虫病传染源的较好措施。注意事项：用本品前应先驱蛔虫，以免引起胆管蛔虫症。来源：www.examda.com（1）用以治疗盘尾丝虫和罗阿丝虫感染时，应从小剂量开始，以减少因虫体破坏而引起的副作用。重度感染的盘尾丝虫病患者，在接受单剂乙胺嗪后，可出现急性炎症反应综合征（Mazzotti反应），表现为发热、心动过速、低血压、淋巴结炎和眼部炎症反应，多由微丝蚴死亡引起。（2）在重度罗阿丝虫感染者采用乙胺嗪治疗后可发生脑病和视网膜出血等。预先给肾上腺皮质激素可减少副作用。来源：www.examda.com（3）对有活动性肺结核、严重心脏病、肝脏病、肾脏病、急性传染病应暂缓治疗。对儿童有蛔虫感染者应先驱蛔虫。[孕妇及哺乳期妇女用药]孕妇、哺乳期妇女应暂缓治疗。更多信息请访问：www.100test.com 执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏相关推荐：2010年执业西药师药物分析：芬普雷司用法 2010年执业西药师药物分析：多奈哌齐 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com