

2010年执业西药师药物分析： 肾上腺素受体阻断药的不良反应及禁忌证执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E6_89_A7_c23_646047.htm

一般不良反应有恶心、呕吐、轻度腹泻等消化道症状，偶见过敏性皮疹和血小板减少等。严重的不良反应常与应用不当有关，可导致严重后果，主要包括：（一）心血管反应 本文来源:百考试题网 由于对心脏的 β_1 受体阻断作用，出现心脏功能抑制，特别是心功能不全、窦性心动过缓和房室传导阻滞的患者，由于其心脏活动中交感神经占优势，故对本类药物敏感性提高，加重病情，甚至引起重度心功能不全、肺水肿、房室传导完全阻滞以致心脏骤停等严重后果。（二）诱发或加剧支气管哮喘 来源

: www.examda.com 由于对支气管平滑肌的 β_2 受体的阻断作用，可使呼吸道阻力增加，诱发或加剧哮喘。（三）反跳现象 来源：考试大 长期应用 β 受体阻断药时如突然停药，可引起原来病情加重，其机制与受体向上调节有关。因此长期用药者应逐渐减量直至停药。 来源：www.100test.com 禁用于严重左室心功能不全、窦性心动过缓、重度房室传导阻滞和支气管哮喘的患者。心肌梗死患者及肝功能不良者应慎用。更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏相关推荐：2010年执业西药师药物分析：芬普雷司用法 2010年执业西药师药物分析：枸橼酸乙胺嗪 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com