

2010年执业西药师：吗啡的不良反应用业药师考试 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E6_89_A7_c23_646065.htm

1.一般不良反应：治疗量吗啡可引起眩晕、恶心、呕吐、便秘、呼吸抑制、尿少、排尿困难（老年多见）、胆道压力升高甚至胆绞痛、直立性低血压（低血容量者易发生）等。偶见烦躁不安等情绪改变。2.耐受性及依赖性：长期反复应用阿片类药物易产生耐受性和药物依赖性。来源：考试大的美女编辑们3.急性中毒：吗啡过量可引起急性中毒。来源：www.100test.com 主要表现为昏迷、深度呼吸抑制以及瞳孔极度缩小。常伴有血压下降、严重缺氧以及尿潴留。呼吸麻痹是致死的主要原因。抢救措施为人工呼吸、适量给氧以及静脉注射阿片受体阻断药纳洛酮。更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 相关推荐：2010年执业西药师：吗啡心血管系统的作用 2010年执业西药师：吗啡的临床应用 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com