

2010年执业西药师：哌替啶的药理作用执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E6\\_89\\_A7\\_c23\\_646067.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E6_89_A7_c23_646067.htm) 哌替啶，又名度冷丁。药理作用与吗啡基本相同。来源：考试大的美女编辑们 镇痛作用弱于吗啡，其效价强度为吗啡的1/7 ~ 1/10，作用持续时间短于吗啡，为2 ~ 4h。镇静、致欣快、呼吸抑制和扩血管作用与吗啡相当。采集者退散 也能兴奋平滑肌，提高平滑肌和括约肌的张力，但因作用时间短，较少引起便秘和尿潴留。大剂量哌替啶也可引起支气管平滑肌收缩。有轻微兴奋子宫作用，但对妊娠末期子宫正常收缩无影响，也不对抗缩宫素的作用，故不延缓产程。更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)