

2010年中药鉴定中药材：慈竹箨执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_646104.htm 【出处】出自《本草纲目》【拼音名】C í Zh ú Tu ò 【英文名】sheaths of Omei Mountain Bamboo 【别名】慈竹笋壳 采集者退散 【来源】药材基源：

禾本科植物慈竹的箨片。 拉丁植物动物矿物名
： *Neosinocalamus affinis* (Rendli) Keng f.[*Sinocalmus affinis* (Rendle) McClure] 采收和储藏：全年均可采，晒干。 【原形态】慈竹 植株呈乔木状。高5-10m，梢端细长作弧形或下垂，全竿共30节左右；节间圆筒形，长15-30（-60）cm，径3-6cm，表面贴生灰白色或褐色疣基小刺毛；竿环平坦；箨环明显；箨鞘革质，背部密被白色短柔毛和棕黑色刺毛，鞘口宽广而下凹，略呈山字形，箨耳无；箨舌呈流苏状，连同毛高约1cm许；箨片两面均被白色小刺毛，具多脉。竿每节约有20条以上的分枝，呈半轮生状簇聚，水平伸展，主枝稍显着，其下部节间长可10cm，径约5mm.末级小枝具数叶乃至多叶；叶鞘长4-8cm，无毛，具纵肋；叶舌截形，棕黑色，高1-1.5mm，上缘啮蚀状细裂；叶片窄披针形，上面无毛，下面被细柔毛，次脉5-10对；叶柄长2-3mm.花枝束生，常弯曲下垂，长20-60cm，节间长1.5-5.5cm；假小穗长达1.5cm；颖0-1，长约6-7mm；外稃宽卵形，具多脉，边缘生纤毛，内稃脊上有纤毛；鳞被3-4；雄蕊6；花柱具微毛，向上分裂为2-4羽毛状柱头。果实纺锤形，黄棕色，易与种子分离而为囊状果。笋期6-9月或自12月至翌年3月，花期多在7-9月，但可持续数月之久。 【生境分布】生态环境：现多见于农家栽

培房前屋后的平地或低丘陵。来源：考试大 资源分布：分布于西南各地。【功能主治】止血；解毒。主吐血；恶疮；犬咬伤【用法用量】内服：煎汤，3-6g；或烧灰研末冲。外用：适量，，烧存性研末调搽。【各家论述】1.《纲目》：治小儿头身恶疮，烧散和油涂之，或入轻粉少许。来源：www.100test.com 2.《民间常用草药汇编》：治吐血。 3.《四川中药志》：治犬（咬）伤。【摘录】《中华本草》更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 相关推荐：2010年中药鉴定中药材：慈竹叶 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com