

2010年中药鉴定中药材：刺楸树皮执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_AD\\_c23\\_646209.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_646209.htm)

【出处】《四川中药志》【拼音名】Cì Qì Shù Pí 采集者退散【别名】丁桐皮、钉皮（《四川中药志》），刺楸皮（《陕西中草药》）。【来源】为五加科植物刺楸的树皮。全年可采，剥取树皮，洗净，晒干。【原形态】刺楸（《救荒本草》），又名：鼓钉刺、刺枫树、刺桐、云楸、棘楸、丁木树、鸟不宿、上山虎、丁皮树、丁桐树、鹅足板树、刺椿、鸭脚板叶。落叶乔木，高可达30米。小枝具粗刺。叶在长枝上互生，短枝上簇生；坚纸质；叶片近圆形，直径7~25厘米，掌状5~7裂，裂片三角状圆卵形至长椭圆状卵形，先端长尖，边缘只锯齿，上面绿色；叶柄长6~30厘米。伞形花序合成顶生的圆锥花丛，直径15~25厘米；伞梗长4~14厘米；花梗长5~12毫米；萼光滑，具五齿；花瓣5，三角状圆卵形，呈镊合状排列；雄蕊5，花丝细长；子房2室，花柱愈合呈圆筒状，先端2裂宿存。果实近于圆球形，直径约5毫米。蓝黑色种子2颗，扁平。花期7~8月。果期9~10月。来源：考试大【生境分布】生长在山谷、溪旁、林缘或疏林中。分布几遍全国。产四川、江苏、浙江、安徽、贵州等地。【性状】干燥树皮呈卷筒状或条块状，长宽不一，厚1~2毫米。栓皮粗糙，表面灰白色至灰棕色，有较深的纵裂纹及横向小裂纹，散生黄色圆点状皮孔，并有纵长的钉刺；钉刺长1~3厘米，宽5~10毫米，灰白色，有黑色斑点，顶端尖锐或已磨成钝头，基部长圆形；钉刺脱落，露出黄色内皮。内表面黄色或紫红色，光滑，有纵纹。

质坚硬，折断面裂片状。气弱，味苦。以干燥、皮厚实、钉刺多者为佳。【化学成份】树皮及叶含鞣质13~30%，树皮及心材含多炔化合物。茎、叶有强心甙和葱甙反应。种子含脂肪油38.65%。本品尚含黄酮甙、香豆精甙、少量生物碱、挥发油、皂甙、树脂、淀粉。皂甙是三萜皂甙，甙元有常春藤皂甙元。【炮制】用水洗净，去刺，润透，切丝，晒干。

【性味】来源：考试大 苦辛，平。 《四川中药志》：性平，味甘苦，无毒。 《江苏药材志》：味苦，性小寒。 《陕西中草药》：味辛微苦，性平。【归经】《四川中药志》：入脾、胃经。【功能主治】祛风，除湿，杀虫，活血。治风湿痹痛，腰膝痛，痈疽，疮癣。 《四川中药志》：祛风行血，除湿杀虫。治腰膝疼痛，风寒湿痹及疥癣。 《江苏药材志》：杀虫，消肿，排脓生肌。治恶疮，疽痿，痈肿，疔痔，咳逆上气，口疮。 《陕西中药志》：祛风除湿，消炎止痛。治跌打损伤，风湿麻木，关节炎。【用法用量】内服：煎汤，3~5钱。外用：煎水洗、捣敷或研末调敷。【备注】本文来源:百考试题网 树枝在江苏、浙江作鸟不宿使用，参见鸟不宿条。本品在四川、江苏、浙江、安徽等地作海桐皮使用，参见海桐皮条。更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)