

2010年中药鉴定中药材：臭辣树执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_646234.htm 【出处】出自《广西药植名录》

【拼音名】ChòuLàShù 【英文名】Fruit of Farges Evodia

【别名】野米辣、臭辣吴萸。 【来源】药材基源：为芸香科植物臭辣树的果实。拉丁植物动物矿物名：Evodia fargesii

Dode 采收和储藏：8-9月采摘成熟果实，鲜用或晒干。 【原

形态】臭辣树 落叶乔木，高15m.树皮平滑，浅灰色至暗灰色，枝条紫褐色至灰褐色，皮孔圆或长圆形。奇数羽状复叶对

生；叶轴顶端小叶柄长1.5-2.5cm，侧生小叶柄长2-6mm；小叶7片（5-11），椭圆状披针形或卵状长椭圆形至披针形，

长6-11cm，宽2-6cm，先端渐尖，基部圆形或宽楔形常偏斜，全缘，上面绿色，无毛或有时疏被短柔毛，下面灰白色，干

后苍绿色或暗褐色，沿主脉疏被长柔毛或脱落，但脉腋间及主脉的基部两侧毛常密生成丛，无腺点。聚伞圆锥花序顶生

，花序长6-10cm，宽8-12cm或更宽，花轴及花柄疏被短柔毛；萼片5浅裂，三角形，长约1mm，边缘被短睫毛；花瓣5，

白色；雄花内退化子房先端5深裂；雌花的退化雄蕊极短小；子房上位，近圆球形，花柱极短小。果4-5裂，稀为3裂，淡

红色。种子棕黑色，卵圆形，直径约3mm.花期6-8月，果期9-10月。 【生境分布】生态环境：生于向阳山坡，溪边湿润树丛中。资源分布：分布于安徽、浙江、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州等地。 【性状】性状鉴别 果实

呈星状扁球形，多由5或4枚中部以下离生果组成。表面棕黄色至绿褐色，略粗糙，具皱纹，油点稀疏，或不甚显，顶端

呈梅花状深裂，基部残留果梗，略被柔毛或无毛。种子棕黑色。质硬而脆。气微香，味苦、微辛辣。【性味】苦；辛；温【归经】肺；肝经【功能主治】目咳；散寒；止痛。主咳嗽；腹痛【用法用量】内服：煎汤，6-9g，鲜品15-18g.【附方】治小儿麻疹后咳嗽不止：自辣树鲜果五至六钱，鲜高粱泡棍四至五钱，鲜金银花藤三至四钱，鲜醉鱼草根四至五钱，甘草三至四钱。水煎，早晚饭前各服一次。【各家论述】1.《广济西药植名录》：治肚痛。2.江西《草药手册》：治麻疹后咳嗽。【摘录】《中华本草》更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com