

2010年中药鉴定中药材：秤杆草执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_646337.htm 【出处】出自《四川常用中草药》 【拼音名】Chèn G n C o 【英文名】Herb of Japanese Eupatorium 【别名】水松萝、野蓝、翠子菜、山金花菜、石上凤仙、铁杆水草、软黄花金魁 【来源】百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com) 药材基源：为苦苣苔科植物贵洲半蒴苣苔的全草。拉丁植物动物矿物名：Hemiboea caoaleriei Levl. 采收和储藏：夏、秋季采收，鲜用或晒干。 【原形态】贵洲半蒴苣苔 多年生草本，高20-11cm.不分枝或少分枝，具4-15节，散生紫斑。叶对生；梗长0.5-6.5cm；叶片干时膜质或薄纸质，长圆状披针形，卵状披针形工椭圆形，长5-20cm，宽2-8cm，先端渐尖或急尖，基部楔形或稍不对称，边缘有浅齿或近全缘，上面疏被短柔毛，下面无毛。聚伞花序顶生，3至多花；花序梗长0.5-6.5cm；苞片近圆形，直径1-2.5cm，开放后呈船形；花梗长2-5mm；花萼5裂至基部，裂片卵状披针形；花冠白色，淡黄色或粉红色，散生紫斑，长3-4.5cm，外面疏被腺状短柔毛，内面近基产约5mm，处有毛环，檐部有紫色斑纹，上唇长约6mm，2裂，下唇长约8mm，3裂；有育雄蕊2，先端连着，退化雄蕊3，中间1个小；花盘环状，高1-1.2mm；子房线形，无毛，柱头钝形。蒴果线状披针形，长1.5-2.5cm，多少弯路曲。种子细小，多数。花期8-9月，果期9-11月。 【生境分布】生态环境：生于海拔600-1500m的山谷林下阴湿处。资源分布：分布于江西、福建、湖南、广东、广西、四川、贵州等地。 【性味】味微酸

；涩；性凉 本文来源:百考试题网 【功能主治】清热鲜毒。
主痛肿疔毒；水火烫伤；跌打损伤 【用法用量】外用：适量
，捣敷；或研末麻油调敷。 【摘录】《中华本草》 更多信息
请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com