

2010年中药鉴定中药材：常春藤子执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_646343.htm 【出处】出自《本草纲目拾遗》

【拼音名】Chán Chūn Tén Zǐ 【英文名】Fruit of Chinese Ivy 【来源】来源：考试大的美女编辑们 药材基源：为五加科植物常春藤的果实。拉丁植物动物矿物名：Hedera Nepalensis k.koch var. Sinensis (Tobl.) Rehd.[H.sinensis Tobl.] 采收和储藏：秋季果熟时采收，晒干。 【原形态】多年生常绿攀援灌木，长3-20cm.茎灰棕色或黑棕色，光滑，有气生根，幼枝被鳞片状柔毛，鳞片通常有10-20条辐射肋。单叶互生；叶柄长2-9cm，有鳞片；无托叶；叶二型；不能枝上的叶为三裂状卵形或戟形，长5-12cm，宽3-10cm，全缘或三裂；花枝上的叶椭圆状披针形，条椭圆状卵形或披针形，稀卵形或圆卵形，全缘；先端长尖或渐尖，基部楔形、宽圆形、心形；叶上表面深绿色，有光泽，下面淡绿色或淡黄绿色，无毛或疏生鳞片；侧脉和网脉两面均明显。伞形花序单个顶生，或2-7个总状排列或伞房状排列成圆锥花序，直径1.5-2.5cm，有花5-40朵；花萼密生棕色鳞片，长约2mm，边缘近全缘；花瓣5，三角状卵形，长3-3.5mm，淡黄白色或淡绿白色，外面有鳞片；雄蕊5，花丝长2-3mm，花药紫色；子房下位，5室，花柱全部合生成柱状；花盘隆起，黄色。果实圆球形，直径7-13mm，红色或黄色，宿存花柱长1-1.5mm.花期9-11月，果期翌年3-5月。 【生境分布】生态环境：附生于阔叶林中树干或沟谷阴湿的岩壁上，庭园也常有栽培。资源分布：分布于西南及陕西、甘肃、山东、灌翰、浙江、江西、福建

、河南、湖北、湖南、广东、广西、西藏等地。【性味】味甘；苦；性温 来源：www.100test.com 【功能主治】补肝肾；强腰膝，行气止痛。主体虚羸弱；采膝酸软，血痹；腕腹冷痛 【用法用量】内服：煎汤，3-9g；或浸酒。 百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com) 【各家论述】《本草拾遗》：主风血羸老，腹内诸冷血闭，强腰脚，变白。 【摘录】《中华本草》 更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com