

2010年中药鉴定中药材：蟾蜍肝执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_AD\\_c23\\_646526.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_646526.htm)

【出处】出自《医林纂要》【拼音名】Chán Chú Gān【英文名】Toad liver【来源】来源：考试大的美女编辑们 药材基源：为蟾蜍科动物中华大蟾蜍或黑眶蟾蜍的肝脏。拉丁植物动物矿物名：1.*Bufo bufo gargarizans* Cantor 2.*Bufo melanostictus* Schneider 采收和储藏：夏、秋季捕捉，剖腹取肝，洗净，鲜用或冷藏。【原形态】来源：考试大 1.中华大蟾蜍，体长一般在10cm以上，体粗壮，头宽大于头长，吻端圆，吻棱显着；鼻孔近吻端；眼间距大于鼻间；鼓膜明显，无犁骨齿，上下颌亦无齿。前肢长而粗壮，指、趾略扁，指侧微有缘膜而无蹼，指长顺序3、1、4、2，指关节下瘤多成对，常突2，外侧者大。后肢粗壮而短，胫跗关节前达肩部，左右跟部不相遇，趾侧有缘膜，蹼常发达，内跖变形长而大，外跖突小而圆。皮肤极粗糙，头顶部较平滑，两侧有大而长的耳后膜，其余部分满布大小不等的圆开瘰疣，排列较规则的为头的之瘰疣，斜行排列几与耳后腺平行。此外，沿体侧之瘰疣排列亦较规则，胫部之瘰疣更大，个别标本有不明显这跗褶，腹面皮肤不光滑，有小疣。颜色亦异颇大，生殖季节雄性背面多为黑绿色，体侧有浅色的斑纹；雌性背面色较浅，瘰疣乳黄色，有时自眼后沿体侧有斜行之黑色纵斑，腹面乳黄色，有棕色或黑色细花纹。雄性个体较小，内侧三指有黑色婚垫，无声囊。 2.黑眶蟾蜍，体长7-10cm，雄性略小；头高，头宽大于头长；吻端圆，吻棱明显，鼻孔近吻端，眼间距大于鼻间距，鼓膜大，无犁

骨齿，上下颌均无齿，舌后端无缺刻。头部沿吻棱、眼眶上缘、鼓膜前缘及上下颌缘有十分明显的黑色骨质棱或黑色线。头顶部显然下凹，皮肤与头骨紧密相连。前肢细长；指、趾略扁，末端色黑；指长序为3、1、4、2；指关节下瘤多成对外常突大，内侧者略小，均为棕色，后肢短，胫跗关节前达肩后方，左右跟部不相遇；足短于胫；趾侧有缘膜，相连成半蹼，关节下瘤不明显；内跖突略大于外跖突。皮肤极粗糙，除头顶部无疣外，其余布满大小不等之圆形疣粒，疣粒上有黑点或刺；头两侧为长圆形之耳腺；近脊中线由头后至臀部有2纵行排列较规则的大疣粒。体大的黑眶蟾蜍腹面满布小棘。生活时体色变异较大，一般为黄棕色略具棕红色斑纹。雄性第1、2指基部内侧有黑色婚垫，有单咽下内声囊。【生境分布】生态环境：1.生活在泥土中或栖居在石下或草间，夜出觅食。2.栖息于潮湿草丛，夜间或雨后常见。捕食多种有害昆虫和其他小动物。资源分布：1.分布于东北、华北、华东、华中及陕西、甘肃、青海、四川、贵州等地。2.分布于浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南等地。【性味】味辛；苦；甘；性凉【归经】心；肝经【功能主治】解毒散结；拔疗消肿。主痈疽；疗毒；疮肿；蛇咬伤；麻疹【用法用量】外用：适量，捣烂敷。内服：煎汤，1-2个。【附方】治麻疹出不透，或迟迟不能出齐，出后很快消失，发热不退或增高：癞虾蟆肝一至二个。水煎服，一至二次即可。（赣州《草医草药简便验方汇编》）【各家论述】www.Examda.CoM考试就到百考试题 1.《医林纂要》：治痈疽疗毒，取其（蟾蜍）肝敷之，数易亦愈。2.《随息居饮食谱》：凡小儿疮家疫病，并宜食之，其（蟾蜍

) 肝尤良。【摘录】《中华本草》 更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)