

2010年中药鉴定中药材：白藜子执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_AD\\_c23\\_646675.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_646675.htm) 【出处】出自《药性论》。

【拼音名】Bái Lǐ zǐ 【英文名】Fruit of Japanese Ampelopsis

【来源】www.Examda.CoM考试就到百考试题 药材基源：为葡萄科植物白藜 *Ampelopsis japonica* (Thunb.) Makino 的果实。拉丁植物动物矿物名：*Ampelopsis japonica* (Thunb.

) Makino [*Paullinia japonica* Thunb.] 采收和储藏：秋果果实成熟时采收，鲜用或晒干。【原形态】白藜 落叶攀援木质藤本，长约1m。块根粗壮，肉质，卵形、长圆形或长纺锤形，深棕褐色，数个相聚。茎多分枝，幼枝带淡紫色，光滑，有细条纹；卷须与叶对生。掌状复叶互生；叶柄长3-5cm，微淡紫色，光滑或略具细毛；叶片长6-10cm，宽7-12cm；小叶3-5，羽状分裂或羽状缺刻，裂片卵形至椭圆状卵形或卵状披针形，先端渐尖，基部楔形，边缘有深锯齿或缺刻，中间裂片最长，两侧的较小，中轴有闲翅，裂片基部有关节，两面无毛。

聚伞花序小，与叶对生，花序梗长3-8cm，细长，常缠绕；花小，黄绿色；花萼5浅裂；花瓣、雄蕊各5；花盘边缘稍分裂。浆果球形，径约6mm，熟时白色或蓝色，有针孔状凹点。花期5-6月，果期9-10月。【生境分布】生态环境：生于山地、荒坡及灌木林中，也有栽培。资源分布：分布于华北、东北、华东、中南及陕西、宁夏、四川等地。【性味】苦；寒

【归经】肝；脾经 来源：考试大 【功能主治】清热；消痈。主温症；热毒痈肿 【用法用量】内服：煎汤，6-10g。外用：适量，研末敷。【各家论述】《药性论》：治温症，主寒热

【来源】www.Examda.CoM考试就到百考试题 药材基源：为葡萄科植物白藜 *Ampelopsis japonica* (Thunb.) Makino 的果实。拉丁植物动物矿物名：*Ampelopsis japonica* (Thunb.

) Makino [*Paullinia japonica* Thunb.] 采收和储藏：秋果果实成熟时采收，鲜用或晒干。【原形态】白藜 落叶攀援木质藤本，长约1m。块根粗壮，肉质，卵形、长圆形或长纺锤形，深棕褐色，数个相聚。茎多分枝，幼枝带淡紫色，光滑，有细条纹；卷须与叶对生。掌状复叶互生；叶柄长3-5cm，微淡紫色，光滑或略具细毛；叶片长6-10cm，宽7-12cm；小叶3-5，羽状分裂或羽状缺刻，裂片卵形至椭圆状卵形或卵状披针形，先端渐尖，基部楔形，边缘有深锯齿或缺刻，中间裂片最长，两侧的较小，中轴有闲翅，裂片基部有关节，两面无毛。

聚伞花序小，与叶对生，花序梗长3-8cm，细长，常缠绕；花小，黄绿色；花萼5浅裂；花瓣、雄蕊各5；花盘边缘稍分裂。浆果球形，径约6mm，熟时白色或蓝色，有针孔状凹点。花期5-6月，果期9-10月。【生境分布】生态环境：生于山地、荒坡及灌木林中，也有栽培。资源分布：分布于华北、东北、华东、中南及陕西、宁夏、四川等地。【性味】苦；寒

【归经】肝；脾经 来源：考试大 【功能主治】清热；消痈。主温症；热毒痈肿 【用法用量】内服：煎汤，6-10g。外用：适量，研末敷。【各家论述】《药性论》：治温症，主寒热

【来源】www.Examda.CoM考试就到百考试题 药材基源：为葡萄科植物白藜 *Ampelopsis japonica* (Thunb.) Makino 的果实。拉丁植物动物矿物名：*Ampelopsis japonica* (Thunb.

) Makino [*Paullinia japonica* Thunb.] 采收和储藏：秋果果实成熟时采收，鲜用或晒干。【原形态】白藜 落叶攀援木质藤本，长约1m。块根粗壮，肉质，卵形、长圆形或长纺锤形，深棕褐色，数个相聚。茎多分枝，幼枝带淡紫色，光滑，有细条纹；卷须与叶对生。掌状复叶互生；叶柄长3-5cm，微淡紫色，光滑或略具细毛；叶片长6-10cm，宽7-12cm；小叶3-5，羽状分裂或羽状缺刻，裂片卵形至椭圆状卵形或卵状披针形，先端渐尖，基部楔形，边缘有深锯齿或缺刻，中间裂片最长，两侧的较小，中轴有闲翅，裂片基部有关节，两面无毛。

聚伞花序小，与叶对生，花序梗长3-8cm，细长，常缠绕；花小，黄绿色；花萼5浅裂；花瓣、雄蕊各5；花盘边缘稍分裂。浆果球形，径约6mm，熟时白色或蓝色，有针孔状凹点。花期5-6月，果期9-10月。【生境分布】生态环境：生于山地、荒坡及灌木林中，也有栽培。资源分布：分布于华北、东北、华东、中南及陕西、宁夏、四川等地。【性味】苦；寒

结壅热肿。【摘录】《中华本草》更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)