

2010年中药鉴定中药材：刺叶木执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_646725.htm 【出处】始载于《福建师范学院学报》。 【拼音名】Cì Yè S n Mù 【英文名】bark of Spinyleaf Aralia 【别名】鸟不企、鸡云木、鹰不扒、雷公木 【来源】百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com) 药材基源：为五加科植物长刺木的根。 拉丁植物动物矿物名：Aralia spinifolia Merr. 采收和储藏：夏、秋季采挖，除去杂质，洗净，鲜用划晒干。 【原形态】灌木，高2-3m.小枝疏生多数长短不等的刺，刺扁，长1-10mm，基部膨大。托叶和叶柄基部合生，先端离生部分锥形，有纤毛；叶大，长40-70cm，二回羽状复叶；羽片长20-30cm，有小叶5-9，小片薄纸质或近膜质，长圆状卵形或状椭圆形，长7-12cm，宽3-6cm，先端渐尖或长渐尖，基部圆形，有时略歪斜，上面脉上疏生小刺和刺毛，下面甚密，边缘有锯齿；侧脉5-7对。伞形花序有多花，直径约2.5cm；总花梗长1-6cm，有刺和刚毛；小花梗8-15mm，密生刺毛；苞片长圆形，长3-6mm，无毛；萼筒边缘有5小齿，三角形；花淡绿白色，花瓣5，卵状三角形，长约1.5mm；雄蕊5，花丝细长，子房5室，花柱5，分离。核果卵球形浆果状，黑褐色，有5棱，长约5mm，花柱宿存。花期8-10月，果期10-12月。 【生境分布】生态环境：生于海拔1000m以下山坡或林缘阳光充足处。 资源分布：分布于江西、福建、湖南、广东、广西等地。 【化学成份】根中含木皂甙 (araloside) H、J、A，木皂甙A甲酯 (araloside A methyl ester)，竹节人参皂甙 (chikusets-susaponin) Ib、IV[1]. 【性味】味苦；性

平 采集者退散【功能主治】祛风除湿；活血止血。主风湿骨痛；头昏头痛；跌打损伤；骨折；吐血；崩漏；蛇咬伤。【用法用量】内服：煎服，9-15g；或泡酒。外用：适量，捣敷。【各家论述】《新华本草纲要》：根：有驳骨，解毒的功能。用于头昏、头痛、吐血、血崩、风湿、跌打。【摘录】《中华本草》更多信息请访问：执业药师网校百考试题论坛百考试题在线考试系统 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com