

2010年中药鉴定中药材：刺桐叶执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_646732.htm

【出处】出自《广州部队常用中草药手册》。【拼音名】Cì Tóng Yè 【英文名】Leaf of Oriental Variegated Coralbean 【别名】鹦哥叶 【来源】百考试题论坛 药材基源：为豆科植物刺桐*Erythrina variegata* L.及乔木刺桐*Erythrina arborescens* Roxb.的叶。

拉丁植物动物矿物名：1.*Erythrina variegata* L.[*E.indica* Lam.]2.*Erythrina arborescens* Roxb.[*E.tienensis* Wang et Tang]

采收和储藏：秋季采收，晒干。

【原形态】1.刺桐 大乔木，高可达20m.树皮灰棕色，枝淡黄色至土黄色，密被灰色绒毛，具黑色圆锥状刺，二三年后即脱落。叶互生或簇生于枝顶；托叶2，线形，长1-1.3cm，早落；3出复叶；小叶阔卵形至斜方状卵形，长10-15cm，顶端小叶宽大于长，先端渐尖而钝，基部近截形或阔菱形，两面叶脉均有稀疏毛茸。总状花序长约15cm，被绒毛；总花梗长7-10cm；花萼佛焰苞状，长2-3cm，萼口斜裂，由背开裂至基部；花冠碟形，大红色，旗瓣长5-6cm，翼瓣与龙骨瓣近相等，短于萼；雄蕊10，二体，花丝淡紫色，长3-3.5cm，花药黄色；花柱1，淡绿色，柱头不分裂，密被紫色软毛。荚果串珠状，微弯曲。种子1-8颗，球形，暗红色。花期3月。2.乔木刺桐 乔木，高7-8m.树皮有刺。三出复叶，小叶肾状扁圆形，长10-20m，宽8-19m，先端急尖，基部近截形，两面无毛；小叶柄粗壮。总状花序腋生，花密集于总花梗上部；花序轴及花梗无毛；花萼2唇形，无毛；花冠红色，长达4cm，翼瓣短，长仅为旗瓣的1/4，龙骨瓣菱形，较翼瓣长，均无爪；雄

蕊10，5长5短；子房具柄，有黄色毛。荚果梭状，稍弯，两端尖，顶端具喙，基部具柄，长约10cm，宽约1.2cm. 【生境分布】来源：考试大的美女编辑们 生态环境：1.野生或栽培为行道树。 2.生于山沟或草坡上。 资源分布：1.分布于浙江、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南等地。 2.分布于四川、贵州、云南等地。 【性味】苦；平 采集者退散 【归经】胃；肠经 【功能主治】消积驱蛔。主小儿疳积；蛔虫症 【用法用量】内服：研末，2-3g.外用：适量，捣敷。 【摘录】《中华本草》 更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 100Test 下载频道 开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com