

2011年中药剂学辅导：大叶排草执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_646979.htm 讲述了大叶排草的出处，拼音名，别名，来源，原形态，生境分布，性味，功能主治，用法用量。【拼音名】Dà Yè Pái Cǎo【来源】药材基源：为报春花科植物大叶过路黄的全草。拉丁植物动物矿物名：Lysimachia fordiana Oliv. 采收和储藏：春、夏季采收，洗净，晒干。来源：www.100test.com【原形态】多年生草本。根茎粗短，发出多数纤维状根，茎通常簇生，直立，肥厚多汁，高30-50cm，圆柱状，散布稀疏黑色腺点，通常不分枝。叶对生，茎端的2对间距短，常近轮生状；具短柄或近无柄，中部叶柄长6-20mm；叶片椭圆形，阔椭圆形以至菱状卵圆形，长6-18cm，宽3-10（-12.5）cm，先端锐尖或短渐尖，基部阔楔形，上面深绿色，下面粉绿色，无毛，两面密布黑色腺点，侧脉4-6对，在下面稍隆起，网脉纤细，不明显；近茎基部的1-2对叶退化呈鳞片状。花序为顶生缩短成近头状的总状花序；苞片卵状披针形至披针形，长1-1.5cm，密布黑色腺点；花梗极短或花序下部的长达6mm；花萼长6-12mm，5分裂近达基部，裂片长圆状披针形，宽2-3.5mm，密布黑色腺点；花冠黄色，长1.2-1.9cm，基部合生部分长4-5mm，5裂，裂片长圆形或长圆状披针形，先端钝或稍尖，有黑色腺点；雄蕊5，花丝下部生成高约3mm的筒，分离部分长3-4mm；花药卵形；子房卵珠形，花柱长约7mm。蒴果近球形，直径3-4（-5）mm，常有黑色腺点。花期5月，果期7月。【生境分布】生态环境：生于密林中和山谷溪边湿地，垂直分布上限可达

海拔800m. 资源分布：分布于广东、广西和云南等地。【性味】淡；性平【功能主治】清热利湿；消肿解毒。主黄疸；浮肿；泄泻；跌打损伤；疾病；疖肿【用法用量】内服：煎汤，10-15g.外用：适量，鲜品捣敷。【摘录】《中华本草》

更多信息请访问：[执业药师课程免费试听](#) [执业药师互动交流](#) [执业药师在线测试模拟题](#) [百考试题执业药师加入收藏](#) 特别推荐：[2011年执业药师考试大纲新变化](#) [2011年执业药师考试报名](#) [2011年执业药师资格考试时间及科目](#) [2011年执业药师考试大纲](#) 相关推荐：[2011年中药剂学辅导：大叶千斤拔根](#) [2011年中药剂学辅导：大叶青木香](#)

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com