

2011年药理学辅导：唑吡坦的应用原则 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E8_8D_AF_c23_646996.htm

唑吡坦的应用原则：每日最高用量不超过20mg。治疗时间应尽可能短，最长不超过4周。治疗偶发性失眠时，用药时间限制在2~5天之内。治疗短暂性失眠时，用药时间不超过2~3周。短期服用者无须逐渐停药。

(1) 每日最高用量不超过20mg. www.Examda.CoM考试就上百考试题 (2) 治疗时间应尽可能短，最长不超过4周。

(3) 治疗偶发性失眠时，用药时间限制在2~5天之内。(4) 治疗短暂性失眠时，用药时间不超过2~3周。(5) 短期服用者无须逐渐停药。长期服用或超过推荐剂量者，需逐渐停药，防止反跳性失眠。更多信息请访问：[#0000ff>执业药师课程免费试听](#) [#0000ff>执业药师互动交流](#) [#0000ff>执业药师在线测试模拟题](#) [red>百考试题执业药师加入收藏](#) 特别推荐

[#0000ff>2011年执业药师考试大纲新变化](#) [#0000ff>2011年执业药师考试报名](#) [#0000ff>2011年执业药师资格考试时间及科目](#) [#0000ff>2011年执业药师考试大纲](#) 相关推荐：

[#0000ff>2011年药理学辅导：唑吡坦的不良反应](#) [#0000ff>2011年药理学辅导：唑吡坦的慎用及禁忌](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com

[#0000ff>2011年药理学辅导：唑吡坦的不良反应](#) [#0000ff>2011年药理学辅导：唑吡坦的慎用及禁忌](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com