

自考《病理学》题库及答案（第六章心血管系统疾病）自考
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E8_87_AA_E8_80_83_E3_80_8A_E7_c67_646015.htm 第六章 心血管系统疾

病 一、试题 [名次解释] 1. 粥样瘤(atheroma) 百考试题自考站，
你的自考专家！ 2. 泡沫细胞(foam cell) 3. 主动脉壁分

离(dissect) 4. 冠心病(coronary heart disease, CHD) 5. 原发性高
血压(primary hypertension) 6. 高血压性脑病(hypertensive

encephalopathy) 7. 脂纹 (fatty streak) 8. 颗粒性萎缩肾

(arteriolar nephrosclerosis) 9. 心肌病(cardiomyopathy) 10.

风湿小体(Aschoff body) 11. 心瓣膜病(valvular vitium of the

heart) 12. 风湿病(rheumatism)： 13. 冠状动脉性猝死(sudden
coronary death) 14. 急进性高血压(accelerated hypertension) 15

. 心绞痛(angina pectoris) 16. 心肌梗死(myocardial infarction)

17. 动脉粥样硬化(atherosclerosis AS) 18. 绒毛心(cor villosum)

[选择题] (一)A型题 1. 与动脉粥样硬化发病关系最为密切的

血脂是 A. HDL B. TG C. LDL D. HDL - C E. VLDL 2. 主动脉粥
样硬化病变最为严重的部位是 A. 升主动脉 B. 主动脉弓 C. 降

主动脉 本文来自:百考试题网 D. 腹主动脉 E. 胸主动脉 3. 下列

因素中哪项与动脉粥样硬化的发生关系最密切？ A. 高脂血症
B. 高血压 C. 吸烟 D. 病毒感染 E. 遗传因素 4. 动脉粥样硬化的

最危险的并发症是 A. 斑块破裂 B. 斑块内出血 C. 粥样性溃疡

D. 钙化 E. 动脉瘤形成 5. 动脉粥样硬化症，常引起猝死的是
哪种血管病变 A. 冠状动脉 B. 脾动脉 C. 主动脉 D. 肾动脉 E. 四

肢动脉 6. 冠状动脉粥样硬化病变的最常见累及部位是 A. 左

冠状动脉前降支 B. 左冠状动脉旋支 C. 右冠状动脉主干 D. 左

冠状动脉主干 E. 右冠状动脉旋支 7. 不属于动脉粥样硬化粥样斑块病变的是 A. 玻璃样变性 B. 粘液样变性 C. 纤维素样变性 D. 病理性钙化 E. 胆固醇结晶 8. 心肌梗死最常发生的部位为 A. 左心室侧壁 B. 左心室前壁近心尖处 C. 左心室后壁 D. 右心室前壁 E. 室间隔后1 / 3 9. 心肌梗死后肉眼能辨认病灶的最早时间为 A. 1 ~ 2小时 B. 6小时后 C. 12小时后 D. 24小时后来来源：考试大 E. 4天后 10. 心肌梗死后梗死灶呈土黄色，说明梗死已发生 A. 2 ~ 3小时 B. 6小时 C. 8 ~ 9小时 D. 4天 E. 7天 11. 冠状动脉粥样硬化性心脏病时，下列哪种病变不会出现？ A. 心肌纤维变性、坏死 B. 心肌纤维化 C. 心肌糖原沉积 D. 心肌代偿性肥大 E. 中性粒细胞浸润 12. 对临床诊断心肌梗死最有帮助的生化改变是 A. 血肌红蛋白升高 B. 血GOT升高 C. 血中GPT升高 D. 血CPK升高 E. 血LDH升高 13. 透壁性心肌梗死后，最易合并心脏破裂的时间为 A. 1 ~ 2天 B. 2 ~ 3天 C. 4 ~ 7天 D. 7天后 E. 2周内任何时间 14. 心肌梗死室壁瘤形成最多发生于 A. 左心室侧壁 B. 左心室后壁 C. 室间隔 D. 右心室 E. 左心室前壁近心尖处 15. 心肌梗死患者常见的死亡原因 A. 心源性休克 B. 心功能不全 C. 心脏破裂 D. 心包填塞 E. 心包炎 16. 左冠状动脉旋支阻塞引起的梗死区域多为 A. 左心室侧壁 B. 左心室前壁 C. 左心室后壁 D. 室间隔前2 / 3 E. 室间隔后1 / 3 本文来源:百考试题网 17. 右冠状动脉阻塞引起的梗死区域为 A. 右心房、室 B. 左心室后壁、室间隔后1 / 3及右心室 C. 左心室侧壁及右心室 D. 室间隔后2 / 3及右心房、室 E. 室间隔前2 / 3及右心室 18. 原发性高血压最常受损的血管是 A. 全身中、小动脉 B. 全身大、中动脉 C. 全身细、小静脉 D. 全身细、小动脉 E. 全身中、小静脉 19. 原发性良性高血压的特征性病

变是 A. 细、小动脉痉挛 B. 细、小动脉的粥样硬化斑 C. 细、小动脉的硬化 D. 细、小动脉的纤维蛋白样坏死 E. 以上都不是

20 . 动脉粥样硬化合并血栓形成的最主要原因是 A. 局部血流缓慢 B. 血流漩涡形成 C. 局部血液凝固性增高 D. 内膜受损、胶原纤维暴露 E. 以上都不是

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com