

实践技能基本操作诊断性腹腔穿刺术实践技能考试 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022__E5_AE_9E_

[E8_B7_B5_E6_8A_80_E8_c22_647022.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022__E5_AE_9E_E8_B7_B5_E6_8A_80_E8_c22_647022.htm) 患者女性，30岁，近两个月来腹部逐渐膨隆，经检查为腹水，其原因不明，现需作诊断性穿刺，请你施行腹腔穿刺术（在医学模拟人上操作）（20分）（1）术前告知之排尿、模拟人体位正确（1分）术前须排尿以防穿刺损伤膀胱；让模拟人坐在靠背椅上（衰弱者可取其考试，大网站收集他适当体位如半卧位、平卧位或侧卧位）。（2）穿刺点选择正确（2分）；选择适宜的穿刺点：左下腹脐与髂前上棘连线中、外1/3交点，此处不易损伤腹壁动脉；脐与耻骨联合连线中点上方1.0cm、偏左或偏右1.5cm处，此处无重要器官且易愈合；侧卧位，在脐水平线与腋前线或腋中线之延长线相交处，此处常用于诊断性穿刺；（3）消毒、局麻操作正确（8分）；常规消毒。（1分）戴无菌手套：（5分）铺消毒洞巾，自皮肤至壁层腹膜以2%利多卡因作局部麻醉。（2分）（4）穿刺操作正确（6分）。穿刺前先测量血压。（1分）考生左手固定穿刺部皮肤，右手持20ml或50ml注射器，针经麻醉处刺入皮肤后，以45度斜刺入腹肌，再与腹壁呈垂直角度刺入腹腔抽吸腹水（3分）。穿刺结束后，消毒针孔部位，并按住针孔3分钟，防止腹水渗漏，加蝶形胶布固定，纱布覆盖。大量放液者需加用腹带加压包扎（2分）。（5）提问：诊断性穿刺抽出的腹水，应进一步作哪些方面的检查？（2分）立即送验腹水常规、生化、细菌培养、如血性腹水还需送脱落细胞检查。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下

载。详细请访问 www.100test.com