

2009年妇产科学辅导：肩难产的病因临床执业医师考试 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/647/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_A6\\_87\\_c22\\_647098.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_A6_87_c22_647098.htm)

1.母亲因素 有巨大儿或肩难产史者易发生肩难产； 骨盆狭窄，尤其是扁平骨盆更易发生肩难产； 骨盆倾斜度过大及耻骨弓位置过低者。 2.胎儿因素 巨大胎儿或部分过期胎儿最易导致肩难产的发生。可能由于胎儿体重增加时，躯体的生长速度大于胎头的生长速度所致。 巨大胎儿的最大胸径若大于其最大头径1.3cm，胸围大于头围1.6cm，或肩围大于头围4.8cm，均可导致肩难产的发生。 联体双胎、胎儿颈部肿瘤、胎儿水肿均可导致肩难产的发生。 更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏相关推荐：2009年妇产科学辅导：肩难产的预测及预防 2009年妇产科学辅导：肩难产对母儿影响 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)