

2009年临床助理医师外科学试题答案及解析（五）临床助理
执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_647113.htm 1.

急进性肾小球肾炎慢性
期治疗措施最主要的是 A.免疫抑制剂 B.糖皮质激素 C.抗凝剂
D.抗血小板解聚药 E.保护残余肾功能 本题正确答案：E 题解
：急进性肾小球肾炎慢性期肾功能出现缓慢、不可逆损害，
此时的治疗主要以保护残余肾功能、延缓慢性
肾衰竭的发展为重点。 2.

诊断肾病综合征必须具备的
依据是 A.大量蛋白尿与血尿 B.低白蛋白血症与高脂血症 C.大
量蛋白尿与低白蛋白血症 D.高脂血症与水肿 E.水肿与低白蛋
白血症 本题正确答案：C 题解：肾病综合征并非是一种独立的
疾病，而是由多种肾小球疾病引起的一组临床综合征。临床
具有以下四个特点：

大量蛋白尿（超过 $3.5\text{g}/24\text{h}$ ）；
低蛋白血症（血浆白蛋白低于 30g/L ）； 水肿； 高脂血症
即高胆固醇和（或）高甘油三酯血症。其中 、 两项为诊
断必备条件，特别是大量蛋白尿。 3.

慢性肾炎合并高
血压尿毒症，肌酐清除率为 $15\text{ml}/\text{min}$ ，同时又有水肿，应选
用下列何种药物 A.双氢克尿噻 B.甘露醇 C.呋塞米 D.氨苯蝶啶
E.利尿合剂 本题正确答案：C 题解：慢性肾炎患者如肾功能
尚好，可用氢氯噻嗪利尿、消除水肿。当肌酐清除率

为 $20\text{ml}/\text{min}$ 以下时，氢氯噻嗪疗效不佳，可选用袢利尿剂如
呋塞米利尿。 4.

男性，40岁。10年前血压 $140/90\text{mmHg}$
，未查尿，有高血压家族史。1个月来双下肢可凹性浮肿，夜
尿 $0\sim 1$ 次。血压 $148/94\text{mmHg}$ ，尿蛋白（ ），沉渣：细胞 10
 $\sim 15/\text{HP}$ ，Hb 10g/L ，BUN 10mmol/L ，Scr $178\mu\text{mol/L}$ ，眼底正

常。最可能的临床诊断是 A.原发性高血压肾损害 B.急进性肾炎 C.急性肾炎 D.隐匿型肾小球疾病 E.慢性肾炎 本题正确答案

: E 题解: 凡急性肾炎迁延1年以上, 应考虑慢性肾炎可能。具有蛋白尿、血尿和管型尿、水肿、高血压表现, 病程迁延至1年以上。不论有无肾功能损害均应考虑本病, 若能除外全身性疾病引起的继发性肾炎和遗传性肾炎, 则临床可诊断为慢性肾炎。 5. 30岁慢性肾炎男病人, 血压21.3 / 13.3kPa

(160 / 100mmHg), 尿常规: 蛋白 ()。优先选用血管紧张素转换酶抑制剂 (ACEI) 的机制是 A.ACEI不引起肾血流下降 B.ACEI在肾功能不全时应用不受限制 C.ACEI不引起电解质紊乱 D.ACEI不引起立位性低血压 E.ACEI能更好地降低肾小球毛细血管内压力 本题正确答案: E 题解: 慢性肾炎应

优先选用血管紧张素转换酶抑制剂 (ACEI) 如卡托普利等, 此类药物能直接降低肾小球内高压, 减轻高滤过, 有延缓肾功能恶化的作用。在严重肾功能不全时应慎用。 6. 关于慢性肾炎, 下述哪项说法正确 A.多数患者无急性肾炎病史 B.多数由急性肾炎发展而来 C.多数是致病菌侵犯肾小球所致 D.多数因治疗不当或贻误治疗而引起 E.多数由链球菌感染而发病 本题正确答案: A 题解: 慢性肾炎起病的形式有: 大多数病例无急性肾炎病史, 病前无感染史, 发病已为慢性肾炎; 少数由急性肾炎迁延不愈超过1年以上转为慢性肾炎或急性肾炎临床“已愈”, 经若干时间后又表现为慢性肾炎。

7. 四联疗法可试用于治疗急进性肾小球肾炎的类型是 A. 型、 型 B. 型、 型 C. 型、 型 D. 型 E. 型 本题正确答案: C 题解: 联合使用糖皮质激素、免疫抑制剂、抗凝剂 (如肝素) 与血小板解聚药 (如双嘧达莫) 四种药, 可试用

于急进性肾小球肾炎 型、 型的治疗。 8. 男性，18岁。慢性肾炎5年，肌酐清除率65ml/min，3天前患肺炎。应选用哪种抗生素 A.卡那霉素 B.羧苄青霉素 C.四环素 D.庆大霉素 E.链霉素 本题正确答案：B 题解：慢性肾炎患者有感染要及时给予有效抗生素如青霉素G、氨苄西林、红霉素等治疗，尽快控制。避免应用对肾有损害的抗生素（如氨基糖苷类抗生素、磺胺类药等）以及其他药物。（9~10题共用备选答案） A. < 50ml B. < 100ml C. < 400ml D. < 500ml E. < 1000ml 9. 无尿的定义是24小时尿量： 本题正确答案：B 题解：无尿的定义是24小时尿量小于100ml，少尿的定义是24小时尿量小于400ml。 10. 少尿的定义是24小时尿量： 本题正确答案：C 题解：无尿的定义是24小时尿量小于100ml，少尿的定义是24小时尿量小于400ml。（11~12题共用备选答案） A.120 / 70mmHg以下 B.125 / 75mmHg以下 C.130 / 80mmHg以下 D.140 / 90mmHg以下 E.140 / 85mmHg以下 11. 慢性肾小球肾炎患者，尿蛋白 1g / d，血压应控制在： 本题正确答案：B 题解：高血压是加速慢性肾小球肾炎肾功能损害的重要因素，应力争把血压控制在理想水平：尿蛋白 1g / d，血压应控制在125 / 75mmHg以下；尿蛋白<1g / d，血压应控制在： 本题正确答案：C 题解：高血压是加速慢性肾小球肾炎肾功能损害的重要因素，应力争把血压控制在理想水平：尿蛋白 1g / d，血压应控制在125 / 75mmHg以下；尿蛋白<1g / d，血压应控制在130 / 80mmHg以下。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com