

2009年外科辅导：灼伤的评估临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_A4_96_c22_647324.htm

病史 灼伤事件的资料可由病人，救护车司机，伴随的家庭人员，同事，警察或消防人员提供。病史应包括处方药的使用，体质性疾患（如过敏性病症，心，肺或肾脏疾患，糖尿病）或精神紊乱（灼伤可能系肉体上的虐待或自杀企图）以及吸烟，饮酒和用药习惯。所有这些因素都会影响病人对灼伤的应答能力。体格检查 必须在灼伤成熟前作全面的体检，成熟时体检所见较难辨认。每一个病人都要计算体表面积（BSA）。身高可即刻测得，而灼伤前的体重则可由家属估计。来源：考试大的美女编辑们在灼伤图上画出灼伤各部位。成人灼伤面积（%BSA）可通过对照病人的灼伤图和九分法来估计，儿童灼伤面积（%BSA）可采用Lund-Browder图）作精确的估计。估计的灼伤深度（
，
度）也记录在灼伤图上。更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师技能加入收藏相关推荐：2009年外科辅导：灼伤的药物治理 2009年外科辅导：灼伤的治疗 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com