

2009年外科辅导：心房间隔缺损的诊断临床执业医师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_A4_96_c22_647723.htm

心房间隔缺损是较常见的一种先天性心脏病。根据北京和上海的临床资料，在各种先天性心脏病中心房间隔缺损分别占24.6%和21.7%。心房间隔缺损较多见于女性，女与男之比为2：1到4：1。心房间隔缺损是由于胚胎期构成心房间隔的有关组织发育不全所形成。百考试题一全国最大教育类网站([www. Examda. com](http://www.Examda.com)) 根据临床症状、体征、胸部X线、心电图和超声心动图检查，一般即可诊断第2孔型心房间隔缺损。少数症状体征不典型的病例，必要时作右心导管检查，发现右心房血液氧含量比腔静脉高1.9容积%以上以及心导管可通过缺损进入左心房，更可明确诊断。更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师技能加入收藏相关推荐：2009年外科辅导：心房间隔缺损的临床表现 2009年外科辅导：心室间隔缺损的临床表现 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com