

2010年儿科护理：早产儿是由什么原因引起的临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_84_BF_c22_647851.htm

孕妇方面：由于引起分娩开始的机理尚未十分明了，因此关于发生早产的原因至今仍有许多不明之处。在临床病历分析中，大部分的早产原因为：

妊娠高血压综合征； 早期破水、胎盘早期剥离或前置胎盘

； 多胎妊娠或羊水过多； 慢性疾病，如心脏病、肾病、肾炎、肝病、糖尿病、重症肺结核、内分泌失调（如习惯性早产）、营养不良等； 贫血及严重的溶血病； 急性传染病伴有高热； 子宫肿瘤子宫内膜炎及子宫颈口松弛； 骨盆及脊椎畸形； 双胎或胎儿畸形； 羊膜早破脐带异常及羊水过多是胎儿因素。 急性或慢性中毒； 激烈情感波动或过劳； 意外受伤或手术。在一小部分患儿中查不出明显原因。

另外，种族及遗传因素也在一定程度上起到影响作用。 婴儿方面：与足月婴儿相比，全身器官发育的不完善，系统调节作用也就相对的不完善。来源：考试大 呼吸系统： 呼吸中枢未成熟。 咳嗽反射较弱，粘液在气管内不易咳出，因此容易引起呼吸道梗阻或吸入性肺炎 肋肌和膈肌都较弱，胸廓较软，扩张不好。肺泡发育不全，肺泡壁较厚，毛细血管少而肺泡空隙较小，吸气时较难扩张，气体交换困难。皮肤表面血流分布的调节反向功能较差，具有隔热作用的皮下脂肪层缺少，内脏到皮肤的热传导距离短，体表面积相对地较大。全身脏器的发育不够成熟，免疫功能存在缺陷，网状内皮系统清除力较低，血液中缺少抗体。早产儿吮奶及吞咽能力均弱，贲门括约肌松弛。来源：考试大的美女编辑们

早产儿的毛细血管脆弱，易于破裂。早产儿出生体重越小，其血红蛋白、红细胞降低越早，有核红细胞持续出现在周围血象中的时间也越长。血小板数也比足月儿的数值低，出生体重越小越低，增加也越慢。对胆红素的结合和排泄不好。肝脏不成熟，肝功能不全，凝血酶原第Ⅱ因子、第Ⅲ因子、第Ⅳ因子等均较足月儿为低。铁及维生素A、D的储存量减少。肝糖原变成血糖的功能减低。肾功能低下由于肾小球、肾小管不成熟，肾小球滤过率低。百考试题论坛 神经系统特点为中枢未成熟。免疫功能低下母体胎盘来的IgG量少，自身细胞免疫及抗体IgA、D、E、GM合成不足，补体水平低下，血清缺乏调理素。更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏相关推荐：2010年儿科护理：早产儿应该做哪些检查 2010年儿科护理：早产儿应该如何治疗 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com