2010年儿科护理：麻疹的病原及流行病学临床执业医师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_84_BF_c22_647951.htm 麻疹的病原 1.麻疹病毒

(measlesvirus) 属副粘液病毒，为RNA病毒，直径约100~250nm，电镜下呈球形颗粒。 2.只有一个血清型，抗原性稳定。来源：考试大的美女编辑们 3.麻疹病毒不耐热，对日光和消毒剂均敏感，但在低温中能长期保存。 4.麻疹病毒可在人胚肾、猴肾及人羊膜细胞中增殖。经组织培养连续传代后，逐渐失去致病性，但保持免疫性，故依此制备减毒活疫苗。

麻疹的流行病学 1.传染源 (Reservoir) 急性期患者和亚临床型带病毒者，一般认为出疹前后5天均有传染性。该病传染性极强，易感者接触后90%以上可得病。 2.传播途径

(Transmission) 百考试题论坛 主要是呼吸道飞沫传染。 3.易感人群 (Susceptibleperson) 人类对麻疹病毒普遍易感。未曾患过麻疹或未接种过麻疹疫苗者均为易感者 4.流行特征

(Epidemicfeatures) 百考试题 - 全国最大教育类网站(www.Examda.com) 本病目前多为散发，但如传染源进入易感者居住集中的地区，则可致暴发流行。流行多发生于冬春两季。在未普及疫苗接种地区，往往每2~3年发生一次流行。当城市易感者超过40%，农村易感者达60~80%时即有发生流行的可能 更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏相关推荐：2010年儿科护理：麻疹的病理表现 2010年儿科护理：麻疹常见的并发症

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com