

2010年儿科护理：小儿麻疹的预防临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/647/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_84\\_BF\\_c22\\_647956.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_84_BF_c22_647956.htm)

1.控制传染源：“四早”（早发现、早报告、早隔离、早治疗）。隔离患者：一般隔离至出疹后5天，并发肺炎者10天。接触过麻疹的易感者应隔离检疫3周。2.切断传播途径：实行“三门”（患者不出门，易感者不串门，送医送药上门），病人住所衣物按规定消毒，病室注意通风换气，充分利用日光或紫外线照射；医护人员离开病室后应洗手更换外衣或在空气流通处停留20分钟方可接触易感者。3.增强人群免疫力，保护易感人群www.

Examda.CoM考试就到百考试题（1）主动免疫1）麻疹减毒活疫苗的应用是预防麻疹最有效的根本办法。2）初种年龄国内规定为生后8个月，7岁时复种一次。来源：考试大的美女编辑们3）应急接种。来源：考试大4）接种注意事项：

对8周内接受过输血、血制品或其它被动免疫制剂者，因其影响疫苗的功效，应推迟接种。有发热、传染病者应暂缓接种。对孕妇、过敏体质、免疫功能低下者、活动性肺结核均应禁忌接种。（2）被动免疫：接触麻疹后5天内肌注免疫血清球蛋白0.25ml/kg，可防止发病。如用量不足或6~9天内注射者可减轻症状，免疫有效期3~8周，以后应采取主动免疫。

更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库

百考试题执业医师加入收藏相关推荐：2010年儿科护理：脊髓灰质炎的病原与病理 2010年儿科护理：小儿麻疹的治疗与新进展

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)