

2010年诊断基础：放射性碘治疗甲亢前应作的准备  
临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/647/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_AF\\_8A\\_c22\\_647975.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E8_AF_8A_c22_647975.htm)

甲亢采用放射性碘治疗，应提前做好如下准备：  
服<sup>131</sup>I前2~4周宜避免用碘剂及其他含碘食物或药物。采集者退散  
<sup>131</sup>I治疗前病情严重，心率超过160次/分钟，血清T<sub>3</sub>、T<sub>4</sub>明显升高者，宜先用抗甲状腺药物或心得安等治疗，待症状有所减轻，方可用<sup>131</sup>I治疗。  
使用抗甲状腺药物患者需要停药，他巴唑停3-5天左右，PTU需要停2周，然后作摄<sup>131</sup>I率测定，接着可采用<sup>131</sup>I治疗。

作血、尿等常规检查、胸透等检查，以了解主要脏器功能。  
作甲状腺摄<sup>131</sup>I率和甲状腺扫描，以便计算药物剂量。  
百考试题 - 全国最大教育类网站([www.Examda.com](http://www.Examda.com)) 向患者说明<sup>131</sup>I治疗的有关注意事项。  
服<sup>131</sup>I的前后几天，病员应卧床休息，避免剧烈活动。更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏相关推荐：2010年诊断基础：放射性碘治疗甲亢调整剂量的原因 2010年诊断基础：放射性碘治疗甲亢时计算剂量的方法 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)