

2010年中医医师外科辅导：脱疽的其他疗法中医执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c22_647989.htm

本病轻证可单用中药或西药治疗，重证应中西医结合治疗。中医以辨证论治为主，但活血化瘀法贯穿始终，常配合静脉滴注活血化瘀药物，以建立侧支循环，改善肢体血运。（1）手术疗法 坏死组织清除术

：待坏死组织与健康组织分界清楚，近端炎症控制后，可行坏死组织清除术，骨断面宜略短于软组织断面。 坏死组织

切除缝合术：坏死组织与正常组织分界清楚，且近端炎症控制后，血运改善，可取分界近端切口，行趾（指）切除缝合术或半足切除缝合术。 截肢术：当坏死延及足背及踝部，

可行小腿截肢术，坏疽发展至踝以上者，可行股部截肢术。

来源：考试大 植皮术：点状或邮票状植皮术适用于创面过大，难以自行愈合，但经治疗后血液循环改善，感染已被控制，肉芽新鲜者。 血运重建术：手术目的在于恢复肢体的

血流，以改善肢体循环，恢复肢体功能，阻止坏疽发生或降低截肢平面。手术包括动脉内膜剥离术、动脉旁路手术、动脉

静脉化。（2）介入治疗 是应用介入放射学手段治疗血管疾病的方法。其目的是使狭窄或闭塞的血管重新开放，以改善肢体血液循环，挽救肢体。包括血管扩张术及血管再通术

，统称为血管成形术。（3）单方验方 每日用毛冬青（毛披树根）100～200g煎水400ml，分2次口服。 复方丹参注射液

2～4ml肌肉注射，每日1～2次；或复方丹参注射液20ml加入10%生理盐水500ml中，静脉滴注，每日1次，2～4周为1个

疗程。（4）病因治疗 动脉硬化性闭塞症：可应用降血脂

、降血压药物。来源：www.examda.com 糖尿病足：积极控制血糖，规范治疗，防治感染，促进肢体血液循环的恢复。

预防与调护 1.禁止吸烟，少食辛辣炙及醇酒之品。 2.冬季户外工作时，注意保暖，鞋袜宜宽大舒适，每天用温水泡洗双足。 本文来源:百考试题网 3.避免外伤。 4.患侧肢体运动锻炼可促进患肢侧支循环形成。方法是：患者仰卧，抬高下肢 $45^{\circ} \sim 60^{\circ}$ 20 ~ 30分钟，然后两足下垂床沿4 ~ 5分钟，同时两足及足趾向下、上、内、外等方向运动10次，再将下肢平放4 ~ 5分钟，每日运动3次。坏疽感染时禁用。 更多信息请访问：[百考试题医师网校](#) [医师论坛](#) [医师在线题库](#) [百考试题执业医师技能加入收藏](#) 相关推荐：2010年中医医师外科辅导：臁疮的治疗 2010年中医医师外科辅导：脱疽的治疗 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com