

2011年药理学辅导：唑吡坦的不良反应用PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E8_8D_AF_c23_647007.htm

唑吡坦的不良反应用：较多见共济失调、手足笨拙、精神紊乱（尤以老年人多见）、精神萎靡等。较少见过敏反应、皮疹；心率增快、面部水肿、呼吸

困难等；（1）较多见共济失调、手足笨拙、精神紊乱（尤以老年人多见）、精神萎靡等。百考试题论坛（2）较少见过敏反应、皮疹；心率增快、面部水肿、呼吸

困难等；昏倒，以老年人多见；低血压（表现为头晕、头昏眼花、晕倒）

；短暂性易激惹、不明原因的兴奋或神经紧张；易激动、幻觉（视、听等）或失眠等。更多信息请访问：

[#0000ff>执业药师课程免费试听](#) [#0000ff>执业药师互动交流](#) [#0000ff>执业药师在线测试模拟题](#)

[red>百考试题执业药师加入收藏](#) 特别推荐：

[#0000ff>2011年执业药师考试大纲新变化](#) [#0000ff>2011年执业药师考试报名时间](#)

[#0000ff>2011年执业药师资格考试时间及科目](#) [#0000ff>2011年执业药师考试大纲](#) 相关推荐：

[#0000ff>2011年药理学辅导：唑吡坦的注意事项](#) [#0000ff>2011年药理学辅导：唑吡坦的慎用及禁忌](#)

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com