

2011年中药剂学辅导：没药的炮制方法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/647/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_AD\\_c23\\_647084.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_647084.htm) 没药的炮制方法：净制，炮炙。

本品为橄榄科植物没药树或爱伦堡没药树的干燥胶树脂。

一、净制：拣净杂质。二、炮炙

- 1.醋制：取净没药，加醋拌匀，焖透，置锅内炒至表面光亮时，取出，放凉。每没药100kg，用醋5kg（《药典85》）。
- 2.炒制：取净没药置锅内，用文火炒至表面光亮时，取出，放凉。
- 3.香附制：取没药拣净杂质，打碎成小颗粒或粗粉末。加入香附60%研成粉，先将香附粉放在锅内用文武火炒热后，又放入没药拌炒，炒至浓烟上升，呈灰褐色，发泡松脆，取出，晾凉。
- 4.麸制：取净没药，大者砸成小块，置锅内炒至出油时，撒入麸皮，继续拌炒至油被麸皮吸尽，药体发虚呈珠状为度，取出，除去麸皮，放凉。每没药1kg，用麸皮0.5kg。
- 5.灯心制：取净没药，大者砸成小块，置锅内炒至出油时，加入灯心同炒，至油被灯心吸尽，没药膨胀呈球状为度，取出簸去灯心，放凉。每没药1kg，用灯心30kg。
- 6.煨制：取净没药大者砸成小块。另取沙子置锅内加热至100℃以上，然后铺上纸2-3层，上摊没药块，继续加热至出油时，用筷子轻轻翻动，并换纸2-3次，至没药呈珠状，不粘手为度，取出，放凉。
- 7.煮制：取没药，加水浸1日，连同水倒入锅内，煮至溶化，滤。

临床应用没药时，由于炮制不过性，患者服后有恶心、呕吐反应。用狗试验证明，狗吃生没药7分钟即吐，服制没药安然无事。事实说明，内服没药不炮制或炮制不过性，服后都有副作用反应。更多信息请访问：[#0000ff>执业药师课程免费试](#)

听 #0000ff>执业药师互动交流 #0000ff>执业药师在线测试模拟题 red>百考试题执业药师加入收藏 特别推荐：#0000ff>2011年执业药师考试大纲新变化 #0000ff>2011年执业药师考试报名时  
间 #0000ff>2011年执业药师资格考试时间及科目 #0000ff>2011年执业药师考试大纲 相关推荐：#0000ff>2011年中药剂学辅导：代赭石的炮制方法提 #0000ff>2011年中药剂学辅导：炮制对药物成分的影响 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)