

2011年中药鉴定辅导：中药材走油的检验 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_647088.htm

中药材走油的检验：看油法。手感法。嗅气法。弯曲法。折断法。剖开法。磨擦法。敲击破壳法。药材在受潮、变色、变质后表面呈现油样物质的变化，称为“走油”。含有脂肪油、挥发油或糖类等成分的药材，如苦杏仁、当归、肉桂、麦门冬、枸杞子等易产生“走油”现象。检验药材是否“走油”的方法有以下几点。

看油法。主要检看中中药材的色泽、油质、脆裂及黏连程度。例如：党参、牛膝、桔梗等药材走油时内外颜色由浅变深；当归、木香、独活等走油时，其表面呈现油样物质；砂仁、巴戟天走油时，则容易碎散或断裂；而麦冬、天冬走油时则黏连成块。

手感法。用手摸或捏中中药材以感觉其软硬及黏性程度。若药材手摸体软，有黏腻感，说明已经走油。如手摸蛤土蟆油感觉发黏，外表出现油状物，即为走油现象。

嗅气法。有些中药材走油易产生一定的气味，如肉豆蔻、胡桃仁走油易产生浓烈的蛤气味；大云、锁阳走油产生酸甜气味；桑葚走油产生糖样气味；乌梢蛇等动物药材走油能产生一种特殊的令人作呕的刺激气味。

弯曲法。防风，板蓝根等药材如果可任意折弯而不断，那就标致着走油了。

折断法。北沙参、桔梗等药材折断后，断面呈现油样的物质，颜色加深，则已经走油。

剖开法。将苍术、白术等剖开察看，若内色加深，又呈油样，即为走油。

磨擦法。酸枣仁、莱菔子等药物，因外皮色深，走油时不易察觉。可用手磨擦使其气味溢出，若闻到特殊的蛤油味即为走油。

敲击破壳法。种子果仁类药材

，敲破种仁，内色呈肉色或棕褐色，具有特殊气味即为走油。如白果、巴豆等药材，破壳后，若见种仁色泽加重，蛤油味浓，说明已走油。药材发生走油一般与贮藏时温度过高、贮藏年久或长期受日光照射、与空气接触，从而引起变质有关。防止走油的方法是将容易走油的中药材干燥后放置阴凉处保存，如能贮于密闭容器中则效果会更好。更多信息请访问：[#0000ff>执业药师课程免费试听](#) [#0000ff>执业药师互动交流](#) [#0000ff>执业药师在线测试模拟题](#) [red>百考试题执业药师](#) [加入收藏](#) 特别推荐：[#0000ff>2010年执业药师考试成绩查询](#) [#0000ff>2011年执业药师考试报名时间](#) [#0000ff>2011年执业药师资格考试时间及科目](#) [#0000ff>2011年执业药师考试大纲](#) 相关推荐：[#0000ff>2011年中药鉴定辅导：羚羊角](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com