

2011年中药剂学辅导：臭柏 PDF转换可能丢失图片或格式，  
建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/647/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_AD\\_c23\\_647177.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_647177.htm) 讲述了臭柏的别名，植物形态，采制，化学成分，性味，功能主治。【出处】出自《中国沙漠地区药用植物》【拼音名】Chòu Bì【来源】药材基源：为柏科植物叉圆柏的枝叶。拉丁植物动物矿物名

：Sabina vulgaris Ant. 采收和储藏：春、夏季采枝叶，晒干或鲜用。【原形态】匍匐灌木，高不及1m，稀为直立灌木或小乔木。枝密集，枝皮灰褐色，裂成薄片；一年生枝的分枝圆柱形，径约1mm.叶二型：幼树上常为刺叶，长3-7mm，上面凹，下面拱圆，中部有长椭圆形或条状腺体；壮龄树上多为鳞叶，背面中部有椭圆形或长圆形；雌球花曲垂，或初期直立，随后俯垂。球果生于向下弯曲的小枝顶端，倒三角状球形或叉球形，长5-8mm，径5-9mm，熟时褐色、紫蓝色或黑色，稍有白粉。种子1-4（-5），多为2-3，微扁，长4-5mm，先端钝或微尖，有纵脊和树脂槽。【生境分布】生态环境：生于海拔1100-2800（-3300）m的多石山坡或针叶树、阔叶树林中，也生于沙丘上。资源分布：分布于西北及内蒙古等地。【性状】性状鉴别 枝叶呈树枝状，圆柱形。叶二型，刺叶常交互对生或有3叶交互轮生，排列紧密，向上斜展，长3-7mm，鳞叶交互对生，排列紧密或稍疏松，斜方形或菱状卵形，长1-2.5mm.气微香，味微涩。【化学成份】含香桉醇（sabinol），鬼臼毒素（podophylloto-xin），挥发油，油中含8-，13-松香二烯（abieta-8-，13-diene），左旋表儿茶酚-（-）-表儿茶[epicatechol-（-）-epicatechol]，右旋儿茶

酚- ( ) -儿茶酚[catechol- ( ) -catechol]，右旋儿茶酚- ( - ) -表儿茶酚[catechol- ( - ) -epicatechol]等。针叶含黄酮化合物。

【药理作用】沙地柏含香桉醇及鬼臼毒素，后者对小鼠肉瘤有伤害作用，能使其出血、坏死。所含挥发油可作局部刺激剂，长期应用于皮肤、粘膜可引起剧烈炎症，过量可致严重的肠胃道炎症反应，引起吐、泻、腹痛甚至死亡。曾有人用来流产，实乃全身中毒之结果，并非对子宫有特异作用。如给狗以香桉醇或本属植物之浸剂连服3周，不致引起肝的脂肪变性，量过大可于2天内死亡（小肠局部有剧烈炎症）。香桉醇不影响豚鼠子宫张力，可取消其自发活动；对离体兔小肠可使其活动立即停止，此为可逆者，不受毛果芸香碱的影响。香桉醇可增加水蛭肌张力，而浸剂则降低之，故两者作用并非完全相同。【性味】苦；辛；性平【功能主治】祛风除湿；活血止痛。主风寒痹痛；皮肤瘙痒；头痛；咳嗽【用法用量】外用：适量，煎水洗浴。内服：煎汤，9-15g.【附方】 治风湿性关节炎，类风湿性关节炎，布氏杆菌病，皮肤瘙痒病：臭柏、蒙古莢、白龙穿彩、麻黄、茵陈、地构叶、北五加、小白蒿各一斤（以上均系鲜品）。水一百斤，煮沸后浸泡五小时，然后再稍加温。取药液洗浴，根据身体情况洗一至一个半小时。洗后不宜受风着凉，宣在伏天为好。风湿性关节炎，地构叶、北五加用量增加；皮肤瘙痒症，白龙穿彩与麻黄用量增加。（《中国沙漠地区药用植物》） 治小便不利，迎风流泪，视物不清，头痛：圆柏果二到三粒。水煎服。（《新疆中草药手册》）【各家论述】1.《新疆中草药手册》：驱风镇静。治风湿性关节炎。2.《中国沙漠地区药用植物》：祛风湿，活血止痛。【摘录】《中华本草》

更多信息请访问：[执业药师课程免费试听](#) [执业药师互动交流](#) [执业药师在线测试模拟题](#) [百考试题执业药师加入收藏](#) 特别推荐：[2011年执业药师考试大纲新变化](#) [2011年执业药师考试报名时间](#) [2011年执业药师资格考试时间及科目](#) [2011年执业药师考试大纲](#) 相关推荐：[2011年中药剂学辅导：臭草](#) [2011年中药剂学辅导：臭常山](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)