

2011年药学综合知识与技能：胰岛素的用量用法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E8_8D_AF_c23_647338.htm 胰岛素一般为皮下注射，1日3~4次。早餐前的1次用量最多。午餐前次之，晚餐前又次之，夜宵前用量最少！胰岛素一般为皮下注射，1日3~4次。早餐前的1次用量最多。午餐前次之，晚餐前又次之，夜宵前用量最少。有时肌注。静注只有在急症时（如糖尿病性昏迷）才用。因病人的胰岛素需要量受饮食热量和成分、病情轻重和稳定性、体型胖瘦、体力活动强度、胰岛素抗体和受体的数目和亲和力等因素影响，使用剂量应个体化。可按病人尿糖多少确定剂量，一般24小时尿中每2-4克糖需注射1个单位。中型糖尿病患者，每日需要量约为5-40单位，于每次餐前30分钟注射（以免给药后发生血糖过低症）。较重病人用量在40单位以上。对糖尿病性昏迷，用量在100单位左右，与葡萄糖（50-100g）一同静脉注射。此外，小量（5-10单位）尚可用于营养不良、消瘦、顽固性妊娠呕吐、肝硬变初期（同时注射葡萄糖）。特别推荐：[#0000ff>2011年执业药师考试报名条件](#)[#0000ff>2011年执业药师考试大纲](#)更多信息请访问：[#0000ff>2011执业药师辅导精品班](#)相关链接：[#0000ff>2011年药理学辅导：药物作用性质和方式的概念](#)[#0000ff>2011年药物分析辅导：维生素c的分析](#) 欢迎进入100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com