

2011年药理学辅导：卡马西平的用药禁忌 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E8_8D_AF_c23_647586.htm 卡马西平的用药禁忌：交叉过敏反应，本品能通过胎盘，孕妇用药是否有致畸作用尚不清楚。本品能分泌入乳汁，约为血药浓度的60%，哺乳期妇女不宜应用。（1）交叉过敏反应：对三环类抗抑郁药不能耐受的病人，对卡马西平可能也不能耐受。（2）本品能通过胎盘，孕妇用药是否有致畸作用尚不清楚。（3）本品能分泌入乳汁，约为血药浓度的60%，哺乳期妇女不宜应用。（4）老年病人对本品敏感者多，可引起精神错乱或激动不安、焦虑、房室传导阻滞或心动过缓。（5）有心脏房室传导阻滞，血小板、血常规及血清铁严重异常，以及骨髓抑制等病史时，本品禁用。（6）下列情况应慎用；转载自:百考试题-[100test.Com] ①乙醇中毒；②心脏损害，包括器质性心脏病和充血性心脏病；③冠状动脉病；④糖尿病；⑤青光眼；⑥对其他药物有血液方面不良反应史的病人（易产生卡马西平诱发骨髓抑制的危险）；⑦肝病，因抗利尿激素分泌异常，以及其他内分泌紊乱，如垂体功能低下、甲状腺功能低下或肾上腺皮质功能减退，所引起的低钠血症可能加剧；⑧尿潴留（可能加剧）；⑨肾病。孕期服用偶可致畸。心肝肾功能不全，孕妇，授乳妇女，房室传导阻滞者禁用。青光眼，老年患者慎用。更多信息请访问：#0000ff>执业药师课程免费试听 #0000ff>执业药师互动交流 #0000ff>执业药师在线测试模拟题 red>百考试题执业药师加入收藏 特别推荐：#0000ff>2011年执业药师考试大纲新变化 #0000ff>2011年执业药师考试报名

时间 #0000ff>2011年执业药师资格考试时间及科目

#0000ff>2011年执业药师考试大纲 相关推荐： #0000ff>2011年
药理学辅导：卡马西平的应用原则 #0000ff>2011年药理学辅导
：卡马西平的临床应用 100Test 下载频道开通，各类考试题目
直接下载。详细请访问 www.100test.com