

2011年药理学辅导：珠氯噻醇 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/647/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_8D\\_AF\\_c23\\_647743.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E8_8D_AF_c23_647743.htm) 讲述了珠氯噻醇的药品名，英文名，别名，作用与用途，用法与用量，副作用与毒性，药物相互作用。 [药品名]珠氯噻醇 [英文名]zuclopenthixol [别名]Sedanx01，Ci30rdin01，Ctopix01 [作用与用途]本品为氟哌噻吨的顺式异构体，具有抗呢醋甲酯引起的刻板症作用，并有抗阿扑吗啡的作用，前者作用比氟哌噻吨弱而比氯丙嗪强20倍，后者作用与氟哌啶醇相同。本品能抑制条件回避反应与僵住症，比氯丙嗪强10倍。抗胆碱作用弱，而抗组胺作用强。口服后可从胃肠道吸收，36小时达高峰浓度，绝对生物利用度为25%，在肝、肺、肠、肾中浓度高，在大脑中浓度低。在肝脏代谢，主要由粪便排出，少量自肾脏排出。血浆t<sub>1/2</sub>为20小时。本品适用于治疗有焦虑和幻觉症状的精神症、类妄想狂幻觉型精神分裂症、青春期痴呆、躁狂及焦虑周期性精神病；精神因素引起的不安、兴奋、精神错乱，脑萎缩过程，外伤后的精神病、震颤谵妄等。本品较适用于老年病人。 [用法与用量]口服：糖衣片，住院病人一般剂量为每日75-150mg，门诊病人每日10-40mg。2mg膜包衣片，每日服用26mg，必要时可增加剂量。10mg膜包衣片，某些急、慢性精神病患者每日服20-70mg，治疗精神因素引起的激动、不安和错乱，每日10-40mg。25mg膜包衣片，治疗急性精神分裂症和躁狂症，每日服25-50mg，在服用23日后可根据需要增加到每日75mg或更多；治疗慢性病人的维持剂量为每日25-50mg。滴剂：某些急、慢性精神病人，每日服20-75mg，（20-75滴）；治

疗精神因素引起的激动、不安和错乱，根据病情严重程度，每日服240mg（240滴）。滴剂可用水稀释或与食品和饮料混合后服用。各种膜包衣片或滴剂的每日剂量可在晚上1次服用或分3次服。[副作用与毒性]（1）本品偶见锥体外系反应、运动困难、静坐不能、血循环障碍、唾液和汗腺分泌失调、胃肠功能障碍、尿潴留、造血功能障碍、胆汁淤积、癫痫发作、角膜或晶体混浊、心脏传导障碍、闭经、溢乳等。用药开始阶段易出现疲倦。（2）本品应禁用于急性酒精中毒、催眠药镇痛药和精神药物中毒、循环性休克及昏迷、对噻嗪、噻吨类过敏的病人。妊娠初期慎用。（3）开始治疗时，应定期检查心电图、血象、肝功能，长期应用，至少每6-12个月检查1次。[药物相互作用]（1）同时服用驱虫药哌嗪，可增加本品的锥体外系反应的发生率。（2）本品可减弱左旋多巴的作用、增强降压药的作用。（3）服用本品的同时饮酒，服用催眠药、镇痛药、镇静药，可相互增强作用，应注意调整剂量。[制剂]糖衣片：每片含二盐酸盐11.83mg（相当于碱10mg）。片剂：每片含二盐酸盐29.58mg（相当于碱25mg）。膜包衣片：每片含二盐酸盐2.38、11.90或29.75mg（相当于碱2、10或25mg）。滴剂：1ml（20滴）含二盐酸盐23.8mg[相当于碱20mg，含酒精14，2%（V/V）]20ml装。注射液（供静注或肌注用）：每支1ml，含29.58mg二盐酸盐（相当于碱25mg）。更多信息请访问：[#0000ff>执业药师课程免费试听](#) [#0000ff>执业药师互动交流](#) [#0000ff>执业药师在线测试模拟题](#) [red>2011年执业药师药专业知识一基础习题汇总](#) 特别推荐：[#0000ff>2011年执业药师考试报名](#) [#0000ff>2011年执业药师考试大纲新变化](#) [#0000ff>2011年执业药师资格考试时间](#)

及科目 #0000ff>2011年执业药师考试大纲 相关推荐：  
#0000ff>2011年药理学辅导：影响血药浓度的主要因素与药物  
效应 #0000ff>2011年药理学辅导：茶碱缓释片药物相互作用  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)