

2011年药理学辅导：盐酸班布特罗口服液 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E8_8D_AF_c23_647746.htm 讲述了盐酸班布特罗口服液的适用症，注意事项，不良反应，药物相互作用，药理，药物代谢动力学。

【适用症】 支气管哮喘、慢性喘息性支气管炎、阻塞性肺气肿和其它伴有支气管痉挛的肺部疾病。

【注意事项】 （1）对于患有高血压、心脏病、糖尿病或甲状腺机能亢进症的患者，应慎用。伴有糖尿病的哮喘患者使用盐酸班布特罗口服液时应加强血糖控制。（2）肝硬化或某些肝功能不全患者，不宜用盐酸班布特罗口服液。（3）患有肾功能不全的患者使用盐酸班布特罗口服液，初始剂量应当减少。

【不良反应】 有震颤、头痛、强直性肌肉痉挛和心悸等，但盐酸班布特罗口服液较其它同类药物不良反应为轻。其强度与剂量正相关，在治疗最初1～2周内大多数副作用自行消失。极少数人可能会出现转氨酶轻度升高及口干、头晕、胃部不适等。

【药物相互作用】 （1）与其他拟交感胺类药物合用作用加强，毒性增加。（2）不宜与肾上腺素能受体阻滞剂（如心得安）合用。

【药理】 盐酸班布特罗口服液在体内转化为特布他林，是肾上腺素， β_2 受体激动剂，舒张支气管平滑肌，达到平喘效果。

【药物代谢动力学】 文献报导，口服盐酸班布特罗后，大约口服剂量的20%被吸收。吸收后被缓慢代谢成有活性的特布他林。盐酸班布特罗和中间代谢物对肺组织显示有亲和力，在肺组织内也进行盐酸班布特罗特布他林的代谢。因此在肺中活性药物可以达到较高浓度。口服盐酸班布特罗口服液后，约7小时可以达到活性代谢物特布

他林的最大血浆浓度，半衰期为17小时左右。盐酸班布特罗及它的代谢物，主要由肾脏排出。更多信息请访问

：[#0000ff>执业药师课程免费试听](#) [#0000ff>执业药师互动交流](#)
[#0000ff>执业药师在线测试模拟题](#) [red>2011年执业药师药学专业](#)
[知识一基础习题汇总](#) 特别推荐：[#0000ff>2011年执业药师考](#)
[试报名时间](#) [#0000ff>2011年执业药师考试大纲新变化](#)
[#0000ff>2011年执业药师资格考试时间及科目](#) [#0000ff>2011年](#)
[执业药师考试大纲](#) 相关推荐：[#0000ff>2011年药理学辅导：](#)
[珠氯噻醇](#) [#0000ff>2011年药理学辅导：茶碱缓释片药物相互作用](#)
[100Test](#) 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com