

2011年药理学辅导：注射用硫酸庆大霉素的不良反应 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E8_8D_AF_c23_647864.htm

注射用硫酸庆大霉素的不良反应：具耳毒性，本品偶可引起加尿、排尿减少等肾功能损害，但多为可逆性，本品可致神经肌肉阻滞和神经毒性反应。

注射用硫酸庆大霉素用量较链霉素、卡那霉素小，临床上不良反应亦较轻。（1）本品具耳毒性，可引起不可逆的听觉、（耳蜗）和平衡（前庭）功能损害，出现听力减退、耳鸣或耳部胀满感、眩晕、步履不稳等。儿童、老年、长期用药者、肾脏功能减退患者须进行药物浓度监测，听力或前庭功能监测。孕妇慎用。（2）本品偶可引起加尿、排尿减少等肾功能损害，但多为可逆性，患者须保证足够水分以减少肾小管损害，肾功能障碍者慎用。（3）本品可致神经肌肉阻滞和神经毒性反应，出现无力、麻木、针刺感、颜面的烧感、颅神经损害、重症肌无力、震颤麻痹。更多信息请访问

：[#0000ff>执业药师课程免费试听](#) [#0000ff>执业药师互动交流](#) [#0000ff>执业药师在线测试模拟题](#) [red>2011年执业药师药专业知识一基础习题汇总](#) [特别推荐：\[#0000ff>2011年执业药师考试报名\]\(#\)](#)

[#0000ff>2011年执业药师考试大纲新变化](#) [#0000ff>2011年执业药师资格考试时间及科目](#) [#0000ff>2011年执业药师考试大纲](#) [相关推荐：\[#0000ff>2011年药理学辅导：药物代谢及影响因素\]\(#\)](#) [#0000ff>2011年药理学辅导：硫酸庆大霉素片的药理作用](#)

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com