

2011年中药剂学知识点：水栀 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/647/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_AD\\_c23\\_647931.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_647931.htm) 讲述了水栀的出处,拼音名，别名，来源，原形态，生境分布，化学成份，药理作用，性味，性状，功能主治，用法用量，摘录。 【出处】出自《福建民间草药》。 【拼音名】Shu Zh ī 【英文名】fruit of Largeflower Gardenia 【别名】伏尸栀子、水栀子、黄箕子、黄枝、马牙栀、建栀、黄栀子、小栀子 【来源】药材基源：为双子叶植物药茜草科植物大花栀子的果实。 拉丁植物动物矿物名：Gardenia jasminoides Ellis var.gran-diflora Nakai采收和储藏：8-11月果实成熟时采收，晒干或烘干。 【原形态】大花栀子，常绿灌木。枝绿色，幼枝具垢状毛。叶对生或3叶轮生；具短柄；托叶膜质，基部合生成鞘；叶片革质，长圆状披针形或卵状披针形，长7-14cm，宽2-5cm，先端渐尖或短尖，全缘，两面光滑，花大，单生于枝端或叶腋，径约7cm，花白色，极香；花萼裂片6，线状；花冠裂片广倒披针形；雄蕊6，花药线形；子房下位，1室，花柱厚，柱头棒状。果实倒卵形或长椭圆形，长3-7cm，径1-1.5cm，黄色，纵棱较高，果皮厚，花萼宿存。花期5-7月。果期8-11月。 【生境分布】分布我国中部及南部。 【性状】性状鉴别 果实较大，长圆形，长3-7cm.表面棕红色或黄棕色，微有光泽，有翅状纵棱5-8条，较高。顶端有宿萼，具5-8个长裂片，多碎断，基部有果柄痕；果皮薄而脆，种子多数。气微，味酸苦。 【化学成份】种子含藏红花素（Crocine）、甘露醇，以及一种熔点为167-168 的成分，可能是植物激素。枝皮含山梨糖醇

( Sorbitol )、甘露醇等多羟基醇。 【性味】苦；寒 【归经】心；肝经 【功能主治】散热解毒；消肿止痛。主治热毒；黄疸；鼻衄；肾炎水肿；挫伤扭伤。 【用法用量】内服：煎汤，10-15g外用：适量，捣敷。 【各家论述】1. 《中国药植志》：能散热毒。 2. 《福建民间草药》：治扭伤。 【摘录】《中华本草》 更多信息请访问：[#0000ff>执业药师课程免费试听](#)  
[#0000ff>执业药师互动交流](#) [#0000ff>执业药师在线测试模拟题](#)  
[red>2011年执业药师药专业知识一基础习题汇总](#) 特别推荐：  
[#0000ff>2011年执业药师考试报名时间](#) [#0000ff>2011年执业药师考试大纲新变化](#) [#0000ff>2011年执业药师资格考试时间及科目](#) [#0000ff>2011年执业药师考试大纲](#) 相关推荐：  
[#0000ff>2011年中药剂学知识点：水栀根](#) [#0000ff>2011年中药剂学知识点：水椎木](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)