

2011年中药剂学知识点：水泽兰 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_647934.htm 讲述了水泽兰的出处，拼音名，别名，来源，原形态，生境分布，化学成份，药理作用，性味，性状，功能主治，用法用量，摘录。【出处】出自《贵州民间药物》。【拼音名】Shu Zé Lán【英文名】all-grass of Chinese Penthorum【别名】扯根菜、水泽蓝、水杨柳、赶黄草、红柳信、流痰草、红曲草、水桃草、双线草、水苋草【来源】药材基源：为虎耳叶科植物扯根菜的全草。拉丁植物动物矿物名：Penthorum chinense Pursh [P.sedoides L.var.chinense (Pursh) Maxim.]采收和储藏：秋后割取全草，晒干。【原形态】扯根菜 多年生草本，高15-80cm，主根明显，呈紫红色。茎直立，常单一或分枝，圆柱形，紫红色。叶互生；无柄或近于无柄；叶片披针形或狭披针形，长3-12cm，宽约1cm，先端渐尖，基部渐窄，边缘具尖锐细锯齿。齿尖有腺点，两面均无毛。聚伞花序2-4分枝，花序轴上疏生短腺毛；花两性，黄色，多数，常排列一侧，向下旋卷；苞片小，卵形或钻形；花梗短；花萼宽钟形，黄绿色，5深裂，裂片三角状卵圆形，长约3mm，先端锐尖；无花瓣，或偶有一白色线形或条状匙形的花瓣；雄蕊10，着生于萼筒上，排列成2轮，稍伸出花萼，花药淡黄色，椭圆形；心皮5，下部合生，上部分离，花柱5，粗短，柱头淡红色，扁球形。蒴果扁平，5裂，有5喙，由心皮的分离部开裂，红紫色，径约5mm.种子细小多数，椭圆形，粗糙。花期7-8月，果期9-10月。【生境分布】生态环境：生于海拔1700m以下的较

阴湿的草丛中或水沟边。资源分布：分布华北、华东、中南及陕西、四川、贵州等地。【性状】根茎呈圆柱状，弯曲，具分枝，长约15cm，直径3-8cm，表面呈红褐色，密生不定根。茎圆柱形，直径1-6mm，红紫色，不分枝或基部分枝。叶膜质，易碎，完整者呈披针形或狭披针形，绿褐色，长3-11.5cm，宽0.6-1.2cm，先端长渐尖或渐尖，基部楔形，边缘具细锯齿；无柄或近无柄。有时枝端可见聚伞花序，花黄绿色，无花瓣，偶见果实，紫红色，直径达6mm.气微，味甘。【性味】味苦、微辛，性寒【归经】肝；肾经【功能主治】利尿除湿，活血散瘀，止血，解毒。主水肿，小便不利，黄疸，带下，痢疾，闭经，跌打损伤，尿血，崩漏，毒蛇咬伤。【用法用量】内服：煎汤，15-30g.外用：捣敷。【各家论述】1.《天宝本草》：通经活血。治跌打损伤，妇女崩带，瘰疬。2.《贵州民间药物》：消肿利水，行气。【摘录】《中华本草》更多信息请访问：[#0000ff>执业药师课程免费试听](#) [#0000ff>执业药师互动交流](#) [#0000ff>执业药师在线测试模拟题](#) [red>2011年执业药师药专业知识一基础习题汇总](#) 特别推荐：[#0000ff>2011年执业药师考试报名](#) [#0000ff>2011年执业药师考试大纲新变化](#) [#0000ff>2011年执业药师资格考试时间及科目](#) [#0000ff>2011年执业药师考试大纲](#) 相关推荐：[#0000ff>2011年中药剂学知识点：水折耳](#) [#0000ff>2011年中药剂学知识点：水栀](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com