

2011年中药剂学知识点：水杨梅根 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_647937.htm 讲述了水杨梅根的出处，拼音名，来源，原形态，生境分布，化学成份，药理作用，性味，性状，功能主治，用法用量，摘录。 【出处】出自《浙江民间常用草药》。 【拼音名】 Shu ǐ Y á n M é i G ē n 【英文名】 Root of Thinleaf Adina 【别名】 头晕药根 【来源】 药材基源：为双子叶植物药茜草科植物细叶水团花的根。 拉丁植物动物矿物名：Adina rubella (Sieb. EtZucc.) Hance采收和储藏：夏、秋采挖多年老植株的根，洗净，切片鲜用或晒干。 【原形态】水杨梅，落叶小灌木，高1-1.5m.小枝细长，红褐色，被柔毛；老枝无毛。叶互生：叶柄极短或无；托叶2，与叶对生，三角形；叶纸质；叶片卵状披针形或卵状椭圆形，长3-4cm，宽1-2.5cm，先端渐尖，基部宽楔形，全缘，上面深绿色，无毛，下面淡绿色，侧脉稍有白柔毛。头状花序球形，顶生或腋生，盛型 直径1.5-2cm；总花梗长2-3cm，被柔毛；花萼筒短，先端5裂；花冠管状，长5-10mm，紫红色或白色，先端5裂，裂片上部有黑色点；雄蕊5，花丝短；子房下位，2室，花柱细长，超出花冠1倍以上。蒴果楔形，长约3mm，成熟时带紫红色，集生成球状。种子多数，细小，长椭圆形，两端有翅。花期6-7月。果期9-10月。 【性状】性状鉴别 根细圆柱形，多弯曲，有分枝，长30-80cm，也有截成长5-6cm短段。根头部稍粗，往下渐细，直径2-3mm.表面灰色或灰黄色，有细纵皱纹及细根痕，刮除栓皮者呈红棕色。体轻，制裁硬韧，不易折断，断面浹坦，皮部易肃落，木部

占大部分，灰黄色至棕黄色。气微，味微苦涩。以根条粗大者为佳。显微鉴别 根横切面：木栓层由数列木栓细胞组成，黄棕色。皮层细胞数列，呈椭圆形，切向延长。韧皮部有众多韧皮纤维束，呈径向排列成行或散在，壁厚，微木化；韧皮射线明显，顶端扩展呈漏半状。木质部宽广，导管单个散在，直径25-135 μm；木纤维散在，壁厚，木化；木射线

宽1-2细胞。【药理作用】水杨梅根醇浸膏每日以5g/kg连续灌胃或腹腔注射6d，对小鼠L615白血病有抑制作用，抑制率为21.4%[1].对宫颈癌细胞、AK肉瘤、W256也有抑制作用[2].

【鉴别】理化鉴别（1）取本品粉末2g，加水20ml，于50-60℃的水浴上加热1h，滤过。取滤液1ml，置试管中强力振插，产生较多且持久的泡沫。（检查皂甙）（2）取本品粉末2g，加乙醇20ml，加热回流20min，滤过。取滤液2ml，置蒸发皿中，挥干，残渣加醋酸酐数滴使溶解，再加浓硫酸1滴，显紫红色，最后呈污绿色。（检查甾类）

【性味】味苦；辛；性凉【归经】肝；肺；肾经【功能主治】清热解表；活血解毒。主治感冒发热；咳嗽；腮腺炎；咽喉肿痛；肝炎；风湿关节痛；创伤出血。

【用法用量】内服：煎汤15-30g.外用：适量，捣敷。

【各家论述】1.《广西中草药》：治肺热咳嗽。

2.《浙江民间常用草药》：抗菌消炎，散瘀活血。【摘录】《中华本草》 更多信息请访问：[执业药师课程免费试听](#) [执业药师互动交流](#) [执业药师在线测试模拟题](#) [2011年执业药师药专业知识一基础习题汇总](#) 特别推荐：[2011年执业药师考试报名](#)时间 [2011年执业药师考试大纲新变化](#) [2011年执业药师资格考试时间及科目](#) [2011年执业药师考试大纲](#) 相关推荐：

#0000ff>2011年中药剂学知识点：水杨枝叶 100Test 下载频道
开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com