

2011年中药剂学知识点：水苏 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_647964.htm 讲述了水苏的出处，拼音名，别名，来源，原形态，生境分布，化学成份，药理作用，性味，性状，功能主治，用法用量，摘录。【出处】出自1.《本经》。2.《纲目》：水苏、芥宁，一类二种尔。水苏气香、芥宁气臭为异。水苏，三月生苗，方茎中虚，叶似苏叶而微长，密齿，面皱色青，对节生，气甚辛烈，六、七月开花成穗，如苏穗，水红色，穗中有细子，状如荆芥子，可种易生，宿根亦自生，沃地者苗高四、五尺。【拼音名】Shu Sū 【英文名】Herb of Japanese Betony 【别名】芥、鸡苏、香苏、龙脑薄荷、芥苴、劳、野紫苏、山升麻、乌雷公、朋头草、陈痧草、水鸡苏 【来源】药材基源：为唇形科植物水苏、华水苏或毛水苏的全草或根。拉丁植物动物矿物名

：1.*Stachys japonica* Miq.2.*Stachys chinensis* Bunge ex Benth.3.*Stachys baicalensis* Fisch.ex Benth.采收和储藏：7-8月采收，鲜用或晒干。【原形态】多年生草本。具横走根茎。茎高20-80cm，节上具小刚毛。叶对生；叶柄长3-17mm，近茎基部者最长，向上渐短；叶片长圆状宽披针形，长5-10cm，宽1-2.3cm，先端微急尖，基部圆形至微心形，边缘具圆齿状锯齿，两面无毛。轮伞花序6-8花，下部者远离，上部稍密集排列成长5-13cm的假穗状花序；小苞片刺状，微小；花萼钟状，连齿长达7.5mm，外被具腺微柔毛，稀毛贴生或近于无毛，10脉，齿5，三角状披针形，具刺尖头；花冠粉红色或淡红紫色，长约1.2cm，筒内具毛环，檐部二唇形，上唇直立，

下唇3裂，中裂片近圆形；雄蕊4，均延伸至上唇片之下；花柱丝状，先端相等2浅裂，子房无毛。小坚果卵球形，无毛。花期7-9月。多年生直立草本。茎高约60cm，单一不分枝，或于基部分枝，四棱形，在棱及节上疏生倒向柔毛状刚毛，其余部分无毛。叶对生；叶柄极短，长2-5mm，或近无柄；叶片长圆状披针形，长5.5-8.5cm，宽1-1.5cm，先端钝，基部近圆形，两面几无毛。轮伞花序通常6花，远离而排列成长假穗状花序；苞片披针形，边缘具刚毛，小苞片微小；花萼钟状，连齿长约1cm，外面沿肋及齿母被柔毛状刚毛，10脉，齿5，披针形；花冠紫色，长1.5cm，花冠筒内具不明显的毛环，檐部二唇形，上唇直立，下唇3裂，中裂片近圆形。小坚果卵圆状三棱形，无毛。花期6-8月。多年生直立草本。茎高50-100cm，单一或在上部具分枝，细棱形，在棱及节上密被倒向至平伸的刚毛。叶对生；叶柄长1-2mm，或近于无柄；叶片长圆状条形，长4-11cm，宽0.7-1.5cm，两面疏生刚毛。轮伞花序通常6花，多数于茎上部排列成假穗状花序；小苞片条形，刺尖，具刚毛；花萼钟状，连齿长9mm，外面沿肋上及齿缘密被柔毛状具节刚毛，10脉，齿5，披针状三角形，具刺尖；花冠淡紫色至紫色，长达1.5cm，花冠筒内具毛环，檐部二唇形，上唇直立，下唇3裂，中裂近圆形。小坚果卵球形。花期夏季。【生境分布】生态环境：生于水沟边或河岸湿地。作画于水沟边及沙地上。生于湿草地及河岸上。资源分布：分布于辽宁、内蒙古、河北、山东、江苏、安徽、浙江、江西、福建等地。分布于东北及内蒙古、河北、山西、陕西、甘肃。分布于黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山西、陕西、山东等地。相关推荐：#0000ff>2011年中药剂

学知识点：水苏根 #0000ff>2011年中药剂学知识点：水塔花叶
知识点复习技巧： #0000ff>2011年执业药师考试考前准备方案
#0000ff>一次性通过执业药师考试的经验 热点推荐：#0000ff>
报名时间 #0000ff>考试大纲 #0000ff>考试大纲新变化 #0000ff>
考试时间及科目#0000ff> 100Test 下载频道开通，各类考试题目
直接下载。详细请访问 www.100test.com